

حول فحص كوفيد-19

إذا كانت لديك أعراض أو كنت على اتصال وثيق بشخص مصاب بـ كوفيد-19، فإن الفحص يعد وسيلة مهمة لحماية عائلتك وأصدقائك ومجتمعك. يعد الفحص المنزلي بواسطة المستضد الطريقة الأكثر ملاءمة لفحص كوفيد-19.

الأسئلة الشائعة حول فحص كوفيد-19

متى و لماذا

من الذي يجب أن يخضع لفحص كوفيد-19؟

نحن نوصي بإجراء فحص كوفيد-19 إذا كانت لديك اعراض أو كنت على اتصال وثيق مع شخص كان لديه كوفيد-19. يعد الفحص المنزلي بواسطة المستضد هو الطريقة الأكثر ملاءمة بشكل متزايد لفحص كوفيد-19.

الفحوصات في المنزل

كيف يمكنني الحصول على مجموعة أدوات فحص مستضد منزلية؟

يمكنك شراء فحوصات كوفيد-19 المنزلية من العديد من صيدليات البيع بالتجزئة أو عبر الإنترنت. فيما يلي بعض الخيارات لشراء أو طلب فحوصات كوفيد-19:

- [موارد فحص كوفيد-19 - البحث حسب الولاية](#)
- [ادوات فحص كوفيد المنزلية - صيدلية CVS](#)
- [فحوصات كوفيد-19 والمواقع | Walgreens Find Care](#)
- [تسديد تكاليف فحوصات كوفيد-19 من التأمين - Amzaon.com](#)
- لدينا أيضًا حفلات مجتمعية تقدم فحوصات كوفيد-19 محدودة في أيام وأوقات محددة؛ لا حاجة إلى موعد. يرجى [الاطلاع على الجدول الزمني](#) لمعرفة الوقت الذي سنكون فيه في منطقتك.

كانت نتيجة الفحص الخاصة بي إيجابية في المنزل. هل أحتاج إلى إجراء فحص PCR؟

إذا كنت تستخدم مجموعة أدوات فحص منزلية وكانت نتيجة الفحص إيجابية، فهذا يعني أنك مصاب بكوفيد-19. لا تحتاج إلى فحص PCR للتأكيد. يرجى بدء [العزل في المنزل](#) على الفور وإخطار الأشخاص المقربين منك بالفحص الإيجابي الخاص بك. قد تتغير هذه الإرشادات بمرور الوقت اعتمادًا على مدى انتشار كوفيد في مجتمعنا.

لقد كان الفحص سلبيًا بعد مخالطة شخص مصاب. ماذا علي أن أفعل؟

إذا كانت نتيجة الفحص المنزلي سلبية، فاتبع [الإرشادات الحالية](#) المتعلقة بالحجر الصحي والفحوصات الأخرى. إذا ظهرت عليك الأعراض، يجب عليك إجراء الفحص مرة أخرى. إذا كان فحص المستضد المنزلي سلبيًا وكانت لديك أعراض، يوصي خبراء الصحة العامة بفحص نفسك مرة أخرى بفحص منزلي بعدها بيوم أو أكثر، أو إجراء فحص PCR.

الفحص الإيجابي

هل أنا في خطر كبير للإصابة بـ كوفيد-19 (COVID-19) الشديد؟

تشمل الحالات عالية الخطورة للإصابة بفيروس كوفيد-19 الشديد الخضوع لعلاج السرطان أو تناول الأدوية حاليًا للزرعة أو الأدوية المثبطة للمناعة لحالات أخرى. وحالات أخرى عالية الخطورة، تشمل الإصابة بأمراض الرئة أو الكلى أو الكبد المزمنة؛ أو داء السكري؛ أو فيروس نقص المناعة البشرية؛ أو السمنة؛ أو الأشخاص الذين يبلغون 65 عامًا أو أكثر، فقد يعرضك هذا مسبقًا لأعراض أسوأ من كوفيد-19 أو الأنفلونزا. [لدى مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها \(CDC\) المزيد من المعلومات.](#)

إذا كان لديك حالة أو أكثر تعرضك لخطر الإصابة بكوفيد-19 الشديد، فقد يجعلك هذا مؤهلاً للحصول على [علاجات كوفيد-19 لمرضى العيادات الخارجية](#) إذا أصبت بكوفيد.

كانت نتيجة الفحص إيجابية. أنا لست في خطر كبير للإصابة بمرض شديد، لكنني قلق بشأن الأعراض التي أعاني منها. ماذا علي أن أفعل؟

- إذا كانت نتيجة الفحص إيجابية، وظهرت لديك أعراض خفيفة، ولا توجد عوامل خطر للإصابة بمرض [حاد](#)، فابق في المنزل واتعزل.
- إذا كانت لديك أعراض معتدلة، فاتصل بطبيبك.
- إذا كانت لديك أعراض شديدة، اذهب إلى غرفة الطوارئ.

[اقرأ المزيد عما يجب عليك فعله إذا كانت نتيجة الفحص إيجابية.](#)

كانت نتيجة الفحص الخاص بي إيجابية وأنا معرض لخطر الإصابة بمرض شديد. أنا قلق بشأن أعراضي. ماذا علي أن أفعل؟

- إذا كنت معرضاً لخطر كبير للإصابة بمرض [خطير](#)، فعليك إما الاتصال بمكتب طبيبك للسؤال عن علاج كوفيد-19 أو الاستفادة من [مواعيد الرعاية الصحية عن بُعد المتاحة](#) من خلال إدارة الصحة العامة في ماساتشوستس. المواعيد متاحة بين الساعة 8 صباحاً و 10 مساءً.
- إذا كنت تعيش في ولاية أخرى، بما في ذلك نيو هامبشير، يمكنك استخدام [محدد مواقع العلاج الوطني للعثور على المواقع](#).

تم التحديث في 28 أبريل / نيسان 2023

