

有關新冠病毒病(COVID-19 – 英語簡稱)檢測

如果您有症狀或曾與 COVID-19 患者有密切接觸，檢測是保障您的家人、朋友和社區的重要方法。家居使用抗原測試劑是檢測 COVID-19 最便捷的方法。

COVID-19 檢測的常見問題解答

何時及為何

誰應該接受 COVID-19 檢測？

如果您有症狀或曾與 COVID-19 患者有密切接觸，我們建議您接受 COVID-19 檢測。家居使用抗原測試劑越來越成為檢測 COVID-19 最便捷的方法。

家中進行檢測

我如何取得家居抗原測試劑？

您可以在很多零售藥房或在網上訂購 COVID-19 家居使用測試劑。以下是獲取或訂購 COVID-19 測試劑的選項：

- [COVID-19 檢測資源 – 以州份檢索](#)
- [COVID 家居使用測試劑 – CVS 藥房](#)
- [COVID-19 檢測和地點 | Walgreens Find Care](#)
- COVID-19 檢測 - 亞馬遜網購店 [Amazon.com](#)
- 我們的社區護理專車在指定日期和時間也提供限量的 COVID-19 檢測：毋須預約。請查看[時間表](#)，了解何時到訪您的所在區。

我在家中檢測的結果呈陽性。我需要接受 PCR 檢測嗎？

如果您用家居檢測而結果呈陽性，則您感染 COVID-19。您不需要 PCR 檢測來確認。請立即開始[居家隔離](#)，並將陽性檢測結果通知您的密切接觸者。本指引可能會隨著時間的推進而改變，具體取決於我們社區中感染 COVID 的人數。

我接觸病毒後檢測的結果呈陰性。我該怎麼辦？

如果您在家中檢測的結果呈陰性，請按照與檢疫隔離和其他檢測相關的[最新指南](#)。如果您出現症狀，應再次檢測。如果家居用的抗原檢測呈陰性而您有症狀，公共衛生專家建議您過一兩天後再進行家居檢測，或進行 PCR 檢測。

檢測結果呈陽性

我患 COVID-19 重症的風險高嗎？

得 COVID-19 重症的高風險因素包括：現正接受癌症治療、現正服用與移植有關的藥物或用於其他疾病的免疫抑制藥物。其他高風險因素包括：患有慢性肺病、腎病或肝病；糖尿病；艾滋病；肥胖症及年屆 65 歲或以上人士，這些因素可能會使您更容易因 COVID-19 或流感而出現更嚴重的症狀。[CDC 在此處提供更多資訊](#)。

如果您有一項或更多的因素使您得 COVID-19 重症的風險增加，而您患上 COVID，您可能符合條件接受 [COVID 門診療法](#)。

我的檢測結果呈陽性。我沒有患重症的高風險因素，但我擔心我的症狀，該怎麼辦？

- 如果您的檢測結果呈陽性及有輕度症狀，但沒有患 [重症](#) 的風險因素，則留在家中進行隔離。
- 如果您有中度症狀，請致電您的醫生。
- 如果您有嚴重症狀，請前往急診室。

[詳閱有關在檢測結果呈陽性時該如何做的更多資訊](#)。

我的檢測結果呈陽性。我有患重症的高風險因素。我擔心我的症狀，該怎麼辦？

- 如果您有患 [重症](#) 的高風險因素，應聯繫您的醫生辦公室查詢 COVID-19 治療，或者使用馬薩諸塞州公共衛生部 [免費提供的遠程就診服務](#)。約診時間是早上 8 時至晚上 10 時。
- 如果您居住在另一個州，包括新罕布什爾州，您可以 [使用全國療法定位器網站來檢索治療地點](#)。

2023 年 4 月 28 日更新版