

## حقائق و معلومات للمرضى، و مقدمي الرعاية

### التفويض المؤقت لباكسلوفيد

### لعلاج مرض فيروس كورونا 2019 (كوفيد-19)

يتم إعطاؤك صحيفة الحقائق هذه لأن مقدم الرعاية الصحية الخاص بك يعتقد أنه من الضروري تزويدك باكسلوفيد لعلاج مرض فيروس كورونا الخفيف إلى المتوسط (كوفيد-19) الناجم عن فيروس سارس كوف-2. تحتوي صحيفة الحقائق هذه على معلومات لمساعدتك على فهم مخاطر وفوائد أخذ باكسلوفيد الذي تلقته أو قد تتلقاه. تحتوي صحيفة الحقائق هذه أيضًا على معلومات حول كيفية تناول باكسلوفيد وكيفية الإبلاغ عن الآثار الجانبية أو المشكلات المتعلقة بمظهر أو تغليف باكسلوفيد.

أصدرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) تصريحًا للاستخدام في حالات الطوارئ (EUA) لإتاحة باكسلوفيد لعلاج كوفيد-19 الخفيف إلى المعتدل لدى البالغين والأطفال الذين تبلغ أعمارهم 12 عامًا أو أكبر ويزنون 88 رطلاً على الأقل (40 كجم) المعرضين لخطر كبير بالإصابة بكوفيد-19 الشديد، بما في ذلك الاستشفاء أو الوفاة (لمزيد من التفاصيل حول EUA، يرجى الاطلاع على "ما هو تصريح الاستخدام في حالات الطوارئ؟" في نهاية هذا المستند). اقرأ صحيفة الحقائق هذه للحصول على معلومات حول باكسلوفيد. تحدث إلى مقدم الرعاية الصحية الخاص بك حول خيارك أو إذا كان لديك أي أسئلة. إنه خيارك أن تأخذ باكسلوفيد.

### ما هو كوفيد-19؟

يحدث كوفيد-19 بسبب فيروس يسمى فيروس كورونا. يمكنك الإصابة بكوفيد-19 من خلال الاتصال الوثيق مع شخص آخر مصاب بالفيروس.

تتراوح أعراض كوفيد-19 من خفيفة جدًا إلى شديدة جدا قد تؤدي إلى الوفاة. بينما تشير المعلومات حتى الآن إلى أن معظم أمراض كوفيد-19 خفيفة، يمكن أن يحدث مرض خطير وقد يتسبب في تفاقم بعضا من حالاتك الطبية الأخرى. يبدو أن كبار السن والأشخاص من جميع الأعمار الذين يعانون من حالات طبية شديدة وطويلة الأمد (مزمنة) مثل أمراض القلب وأمراض الرئة والسكري، على سبيل المثال، معرضون بدرجة أكبر لخطر دخول المستشفى بسبب كوفيد-19.

### ما هو باكسلوفيد؟

باكسلوفيد هو دواء متوفر بموجب التصريح للاستخدام في حالات الطوارئ (EUA) لعلاج كوفيد-19 الخفيف إلى المعتدل لدى البالغين والأطفال الذين تبلغ أعمارهم 12 عامًا أو أكبر والذين يزنون 88 رطلاً على الأقل (40 كجم) المعرضين لخطر كبير للإصابة إلى كوفيد-19 الشديد، بما في ذلك الاستشفاء أو الوفاة. على الرغم من اعتماد باكسلوفيد من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) لعلاج كوفيد-19 لدى بعض البالغين (انظر قسم ما هي خيارات العلاج الأخرى المتوفرة؟)، يظل استخدام باكسلوفيد في الأطفال قيد البحث لأنه لا يزال قيد الدراسة. هناك معلومات محدودة حول سلامة وفعالية استخدام باكسلوفيد لعلاج الأطفال المصابين بفيروس كوفيد-19 الخفيف إلى المعتدل.

### ما هي أهم المعلومات التي يجب أن أعرفها عن باكسلوفيد؟

يمكن أن يتفاعل باكسلوفيد مع أدوية أخرى مما يسبب آثارًا جانبية خطيرة أو تهدد الحياة أو الوفاة. من المهم معرفة الأدوية التي لا ينبغي تناولها مع باكسلوفيد.

لا تأخذ باكسلوفيد إذا:

من الذي يجب ألا يأخذ باكسلوفيد بشكل عام؟

لا تأخذ باكسلوفيد إذا:

• كنت تتناول أي من الأدوية التالية:

- |   |                            |                        |
|---|----------------------------|------------------------|
| ○ رانولازين   | ○ لوميتابيد                | ○ الفوزوسين            |
| ○ ريفامبين  | ○ لوفاستاتين               | ○ أميودارون            |
| ○ ريفابنتين   | ○ لوماكفتور / إيفاكافتور   | ○ أباتاميد             |
| ○ نبتة سانت جون (عشبة القديس يوحنا)                       | ○ لوراسيدون                | ○ كاربامازيبين         |
| ○ سيلدينافيل (ريفاتييو®) لارتفاع ضغط الدم الشرياني الرئوي | ○ ميتيلرجونوفين            | ○ الكولشيسين           |
| ○ سيلودوسين   | ○ ميدازولام (عن طريق الفم) | ○ ثنائي هيدروإرغوتامين |
| ○ سيمفاستاتين   | ○ نالوكسيجول               | ○ درونيدارون           |
| ○ تولفابتان   | ○ الفينوباربيتال           | ○ إلبترينتان           |
| ○ تريازولام   | ○ الفينيتوين               | ○ إلبيرينون            |
| ○ أوبروجيبانت   | ○ بيموزيد                  | ○ الإرغوتامين          |
| ○ فوكلوسبورين   | ○ بريميديون                | ○ فينيريون             |
|   | ○ بروفاينون                | ○ فليكاينيد            |
|   | ○ كينيدين                  | ○ فليبانسرين           |
|   |                            | ○ إيفابرادين           |

هذه ليست الأدوية الوحيدة التي قد تسبب آثارًا جانبية خطيرة أو تهدد الحياة إذا تم تناولها مع باكسلوفيد. قد يزيد باكسلوفيد أو ينقص مستويات العديد من الأدوية الأخرى. من المهم جدًا إخبار مقدم الرعاية الصحية الخاص بك عن جميع الأدوية التي تتناولها لأن الاختبارات المعملية الإضافية أو التغييرات في جرعة الأدوية الأخرى قد تكون ضرورية أثناء العلاج باستخدام باكسلوفيد. قد يخبرك مقدم الرعاية الصحية الخاص بك أيضًا عن أعراض معينة يجب الانتباه إليها والتي قد تشير إلى أنك بحاجة إلى إيقاف أو تقليل جرعة بعض الأدوية الأخرى الخاصة بك.

- لديك حساسية من نيرماترلفير أو ريتونافير أو أي من مكونات باكسلوفيد. انظر نهاية هذه النشرة للحصول على قائمة كاملة بالمكونات في باكسلوفيد. راجع "ما هي الآثار الجانبية المحتملة المهمة لـ باكسلوفيد؟" لعلامات وأعراض الحساسية.

ماذا يجب أن أخبر مقدم الرعاية الصحية الخاص بي قبل أن آخذ باكسلوفيد؟

أخبر مقدم الرعاية الصحية الخاص بك إذا كنت:

- لديك مشاكل في الكلى. قد تحتاج إلى جرعة مختلفة من باكسلوفيد.
- لديك مشاكل في الكبد، بما في ذلك التهاب الكبد.
- لديك عدوى فيروس نقص المناعة البشرية 1 (HIV-1). قد يؤدي باكسلوفيد إلى عدم عمل بعض أدوية HIV-1 بشكل جيد في المستقبل.
- حامل أو تخططين للحمل. من غير المعروف ما إذا كان باكسلوفيد يمكن أن يؤدي طفلك الذي لم يولد بعد. أخبر مقدم الرعاية الصحية الخاص بك على الفور إذا كنت حاملاً أو إذا أصبحت حاملاً.
- الرضاعة الطبيعية أو التخطيط للرضاعة الطبيعية. من غير المعروف ما إذا كان يمكن أن ينتقل باكسلوفيد إلى حليب الثدي

الخاص بك. تحدث إلى مقدم الرعاية الصحية الخاص بك حول أفضل طريقة لإطعام طفلك أثناء العلاج باستخدام باكسلوفيد.

### قد تتفاعل بعض الأدوية مع باكسلوفيد وقد تسبب آثارًا جانبية خطيرة.

- أخبر مقدم الرعاية الصحية الخاص بك عن جميع الأدوية التي تتناولها، بما في ذلك الأدوية التي تصرف دون وصفة طبية والفيتامينات والمكملات العشبية.
- يمكن لمقدم الرعاية الصحية أن يخبرك ما إذا كان من الآمن تناول باكسلوفيد مع أدوية أخرى.
- يمكنك أن تطلب من مقدم الرعاية الصحية أو الصيدلي الحصول على قائمة بالأدوية التي تتفاعل مع باكسلوفيد.
- لا تبدأ في تناول دواء جديد دون إخبار مقدم الرعاية الصحية الخاص بك.

أخبر مقدم الرعاية الصحية الخاص بك إذا كنت تأخذين وسائل منع الحمل الهرمونية المركبة. قد يؤثر باكسلوفيد على طريقة عمل موانع الحمل الهرمونية. يجب على النساء القادرات على الحمل استخدام شكل بديل فعال آخر من وسائل منع الحمل أو وسيلة حاجز إضافية لمنع الحمل أثناء العلاج باستخدام باكسلوفيد. تحدث إلى مقدم الرعاية الصحية الخاص بك إذا كان لديك أي أسئلة حول وسائل منع الحمل التي قد تكون مناسبة لك.

### كيف أخذ باكسلوفيد ؟


- خذ باكسلوفيد تمامًا كما يخبرك مقدم الرعاية الصحية الخاص بك أن تأخذه.
- يتكون باكسلوفيد من دوائين: أقراص نيرماتريلفير وأقراص ريتونافير. يتم تناول الدوائين معًا مرتين يوميًا لمدة 5 أيام.
  - نيرماتريلفير هو قرص بيضاوي وردي اللون.
  - ريتونافير قرص أبيض.
- يتوفر باكسلوفيد في عبوتين جرعات (انظر الشكلين أ و ب أدناه). سيصف موفر الرعاية الصحية الخاص بك جرعة باكسلوفيد المناسبة لك.
- إذا كنت مصابًا بمرض في الكلى، فقد يصف لك مقدم الرعاية الصحية جرعة أقل (انظر الشكل ب). تحدث إلى مقدم الرعاية الصحية الخاص بك للتأكد من حصولك على حزمة الجرعة الصحيحة.

## الشكل أ


باكسلوفيد 300 مجم؛ عبوة جرعة 100 مجم: كل جرعة تحتوي على 3 أقراص.



كيف تأخذ باكسلوفيد 300 مجم؛ عبوة جرعة 100 مجم



**جرعة الصباح:**  
خذ قرصين من اقراص نيرماترلفير الوردى و 1 قرص ريتونافير أبيض معاً في نفس الوقت كل صباح.



**جرعة المساء:**  
خذ قرصين من اقراص نيرماترلفير الوردى و 1 قرص ريتونافير أبيض معاً في نفس الوقت كل صباح.



## الشكل ب

إذا تم وصف باكسلوفيد 150 مجم لك؛ عبوة جرعة 100 مجم: كل جرعة تحتوي على 2 حبة.



**Pfizer**

**PAXLOVID™**  
(nirmatrelvir tablets; ritonavir tablets),  
co-packaged for oral use

Each carton contains 20 tablets in 5 blister cards  
Each blister card contains 4 tablets:

- 2 nirmatrelvir tablets (150 mg each)
- 2 ritonavir tablets (100 mg each)

**150 mg; 100 mg Dose Pack**

**Morning Dose** - Take both tablets at the same time from the morning dose portion of the blister card (white side).

**Evening Dose** - Take both tablets at the same time from the evening dose portion of the blister card (pink side).

For use under Emergency Use Authorization. Rx only

كيف تأخذ باكسلوفيد 150 مجم ؛ عبوة جرعة 100 مجم

**PAXLOVID™**  
(nirmatrelvir tablets;  
ritonavir tablets),  
co-packaged for oral use  
**150 mg nirmatrelvir;  
100 mg ritonavir**

nirmatrelvir  
tablet  
(150 mg)

**Morning Dose**  
Take both tablets  
at the same time. 

ritonavir  
tablet  
(100 mg)

Tablet cavity  
intentionally  
left empty

جرعة الصباح:  
خذ قرص نيرماتريفير الوردي و  
قرص ريتونافير أبيض إلى أبيض مائل للصفرة  
معًا في نفس الوقت كل صباح.



**PAXLOVID™**  
(nirmatrelvir tablets;  
ritonavir tablets),  
co-packaged for oral use  
**150 mg nirmatrelvir;  
100 mg ritonavir**

Tablet cavity  
intentionally  
left empty

**Evening Dose**  
Take both tablets  
at the same time. 

ritonavir  
tablet  
(100 mg)

nirmatrelvir  
tablet  
(150 mg)

جرعة المساء:  
خذ قرص نيرماتريفير الوردي و  
قرص ريتونافير أبيض إلى أبيض مائل للصفرة  
معًا في نفس الوقت كل مساء.



- لا تقم بإزالة أقراص باكسلوفيد من البطاقة البلاستيكية قبل أن تكون مستعدًا لتناول جرعتك.
  - خذ جرعتك الأولى من باكسلوفيد في الصباح أو المساء، اعتمادًا على وقت استلام الوصفة الطبية، أو على النحو الموصى به من قبل مقدم الرعاية الصحية الخاص بك.
- ابتلع الأقراص كاملة. لا تمضغ أو تكسر أو تسحق الأقراص.
- خذ باكسلوفيد مع أو بدون طعام.
- لا تتوقف عن تناول باكسلوفيد دون التحدث إلى مقدم الرعاية الصحية الخاص بك، حتى لو كنت تشعر بتحسن.
- إذا فاتتك جرعة من باكسلوفيد في غضون 8 ساعات من الوقت المعتاد لتناولها، فتناولها بمجرد أن تتذكرها. إذا فاتتك جرعة لأكثر من 8 ساعات، فتجاوز الجرعة الفائتة وتناول الجرعة التالية في وقتك المعتاد. لا تأخذ جرعتين من باكسلوفيد في نفس الوقت.
- إذا كنت تأخذ الكثير من باكسلوفيد، فاتصل بمقدم الرعاية الصحية أو اذهب إلى أقرب غرفة طوارئ في المستشفى على الفور.
- إذا كنت تتناول دواء يحتوي على ريتونافير أو كوبيسيستات لعلاج التهاب الكبد سي أو فيروس نقص المناعة البشرية (HIV)، يجب أن تستمر في تناول دوائك كما هو موصوف من قبل مقدم الرعاية الصحية الخاص بك.

تحدث إلى مقدم الرعاية الصحية الخاص بك إذا كنت لا تشعر بتحسن أو إذا كنت تشعر بسوء بعد 5 أيام.

### ما هي الآثار الجانبية المحتملة الهامة لباكسلوفيد؟

قد يسبب باكسلوفيد آثارًا جانبية خطيرة ، بما في ذلك:

#### الآثار الجانبية المحتملة لباكسلوفيد هي:

- حدثت تفاعلات تحسسية، بما في ذلك تفاعلات حساسية شديدة (الحساسية المفرطة) أثناء العلاج بباكسلوفيد. توقف عن تناول باكسلوفيد واحصل على المساعدة الطبية فورًا إذا ظهرت عليك أي من الأعراض التالية لرد فعل تحسسي:
  - طفح جلدي، شرى، بثور أو تقشير
  - صعوبة في البلع أو التنفس
  - تورم الوجه
  - تورم الفم والشفتين واللسان أو الوجه
  - تقرحات أو تقرحات مؤلمة في الفم
  - أو الأنف أو الحلق أو منطقة الأعضاء التناسلية
  - مشاكل في الكبد. أخبر مقدم الرعاية الصحية الخاص بك على الفور إذا ظهرت عليك أي من العلامات والأعراض التالية لمشاكل الكبد أثناء العلاج باستخدام باكسلوفيد:
    - فقدان الشهية
    - اصفرار بشرتك وبياض عينيك
    - براز شاحب اللون
    - ألم في منطقة المعدة (البطن)
    - حكة في الجلد
    - بول داكن اللون

تشمل الآثار الجانبية الأكثر شيوعًا لباكسلوفيد: تغير في حاسة التذوق والإسهال.

#### تشمل الآثار الجانبية المحتملة الأخرى ما يلي:

- صداع
- التقيؤ
- وجع بطن
- غثيان
- ضغط دم مرتفع
- الشعور بتوعك بشكل عام

هذه ليست كل الآثار الجانبية المحتملة لباكسلوفيد. لمزيد من المعلومات، اسأل طبيبك أو الصيدلي.

## ما هي خيارات العلاج الأخرى الموجودة؟

تم اعتماد باكسلوفيد من قِبل إدارة الغذاء و الدواء الأمريكية (FDA) لعلاج كوفيد-19 الخفيف إلى المعتدل لدى بعض البالغين؛ ومع ذلك، لا توجد كميات كافية من العروض التقديمية المعتمدة (أي حزم الجرعات) من باكسلوفيد في هذا الوقت. يستمر التصريح للاستخدام في حالات الطوارئ (EUA) باستخدام باكسلوفيد في حالات الطوارئ للمرضى المعتمدين لضمان استمرار امكانية الحصول عليه من أجل تلبية احتياجات الصحة العامة.

تم اعتماد فيكلوري (ريمسيفير) من قِبل إدارة الغذاء و الدواء الأمريكية (FDA) لعلاج كوفيد-19 الخفيف إلى المعتدل لدى بعض البالغين والأطفال. تحدث مع مقدم الرعاية الصحية الخاص بك لمعرفة ما إذا كان فيكلوري مناسباً لك.

للحصول على معلومات حول الاستخدام الطارئ للأدوية الأخرى المصرح بها من قبل إدارة الغذاء و الدواء الأمريكية لعلاج الأشخاص المصابين بكوفيد-19، يرجى الذهاب إلى <https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/mcm-legal-regulatory-and-policy-framework/emergency-use-authorization>. قد يتحدث معك مقدم الرعاية الصحية الخاص بك عن التجارب السريرية التي قد تكون مؤهلاً لها.

إنه خيارك أن تتم معالجتك أو عدم معالجتك باستخدام باكسلوفيد. إذا قررت عدم تلقيه أو إذا قررت عدم إعطائها لطفلك، فلن يغير ذلك الرعاية الطبية الخاصة بك.

## ماذا لو كنت حامل أو مرضعة؟

هناك خبرة محدودة في علاج النساء الحوامل أو المرضعات باستخدام باكسلوفيد. بالنسبة للأم والطفل الذي لم يولد بعد، قد تكون فائدة تناول باكسلوفيد أكبر من مخاطر العلاج. إذا كنتِ حاملاً، ناقشي خياراتك ووضعك المحدد مع مقدم الرعاية الصحية الخاص بك.

إذا كنتِ ترضعين طفلك رضاعة طبيعية، ناقشي خياراتك وحالتك الخاصة مع مقدم الرعاية الصحية الخاص بك.

كيف يمكنني الإبلاغ عن الآثار الجانبية أو المشاكل في مظهر أو تغليف باكسلوفيد ؟  
اتصل بمقدم الرعاية الصحية الخاص بك إذا كان لديك أي آثار جانبية تزعجك أو لا تختفي

أبلغ عن الآثار الجانبية أو المشاكل المتعلقة بمظهر أو تغليف PAXLOVID (انظر الشكلين أ و ب أعلاه للحصول على أمثلة لعلب جرعة باكسلوفيد) إلى **FDA MedWatch** على [www.fda.gov/medwatch](http://www.fda.gov/medwatch) أو اتصل بالرقم 1-800-FDA-1088 أو يمكنك الإبلاغ الآثار الجانبية لشركة Pfizer Inc. على معلومات الاتصال الواردة أدناه.

رقم الهاتف	رقم الفاكس	البريد الإلكتروني
1-800-438-1985	1-866-635-8337	<a href="mailto:SGP.AEReporting@pfizer.com">SGP.AEReporting@pfizer.com</a>

## كيف يمكنني تخزين باكسلوفيد ؟

قم بتخزين أقراص باكسلوفيد في درجة حرارة الغرفة، بين 68 درجة فهرنهايت إلى 77 درجة فهرنهايت (20 درجة مئوية إلى 25 درجة مئوية).  
احفظ باكسلوفيد وجميع الأدوية بعيداً عن متناول الأطفال.

ماذا لو كانت لدي أسئلة حول تاريخ انتهاء صلاحية باكسلوفيد الخاص بي؟  
قامت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) بتمديد تاريخ انتهاء الصلاحية (العمر الافتراضي) لبعض الكثير من باكسلوفيد. للعثور على تاريخ انتهاء الصلاحية الممتد ، أدخل رقم الدفعة الموجود على جانب الكرتون أو الجزء السفلي من حزمة نطفة في هذا الموقع: <https://www.paxlovidlotexpiry.com/> أو تحدث مع مقدم الرعاية الصحية الخاص بك. يمكن أيضًا العثور على معلومات حول امتدادات العمر الافتراضي المصرح بها لباكسلوفيد على <https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/mcm-legal-ululatory-and-policy-framework/expiration-dating-extension>.

### كيف يمكنني معرفة المزيد عن كوفيد-19؟

- اسأل مقدم الرعاية الصحية الخاص بك.
- قم بزيارة <https://www.cdc.gov/COVID19>
- اتصل بقسم الصحة العامة المحلي أو التابع للولاية.

### ما هو تصريح الاستخدام في حالات الطوارئ (EUA)؟

قامت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) بإتاحة باكسلوفيد بموجب آلية وصول للطوارئ تسمى ترخيص استخدام الطوارئ (EUA). يتم دعم EUA من خلال إعلان وزير الصحة والخدمات الإنسانية (HHS) أن هناك ظروفًا تبرر الاستخدام الطارئ للأدوية والمنتجات البيولوجية أثناء جائحة كوفيد-19.

عند إصدار تصريح الاستخدام في حالات الطوارئ (EUA)، حددت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)، من بين أمور أخرى، ذلك بناءً على المبلغ الإجمالي للأدلة العلمية المتاحة بما في ذلك البيانات من كافية و التجارب السريرية جيدة التحكم ، إذا كانت متوفرة ، فمن المعقول الاعتقاد بأن المنتج قد يكون فعالاً في تشخيص أو علاج أو الوقاية من كوفيد-19، أو مرض أو حالة تهدد الحياة بسبب كوفيد-19؛ أن الفوائد المعروفة والمحتملة للمنتج، عند استخدامها لتشخيص أو علاج أو منع مثل هذا المرض أو الحالة، تفوق المخاطر المعروفة والمحتملة لهذا المنتج؛ وأنه لا توجد بدائل مناسبة ومعتمدة ومتاحة.

يجب استيفاء كل هذه المعايير للسماح بتوفر المنتج بموجب تصريح الاستخدام في حالات الطوارئ (EUA). يسري قانون EUA الخاص بباكسلوفيد طوال مدة إعلان كوفيد-19 الذي يبرر الاستخدام الطارئ لهذا المنتج، ما لم يتم إنهاء إعلان EUA ذي الصلة أو إلغاء EUA (وبعد ذلك قد لا يتم استخدام المنتجات بموجب EUA).

### ما هي المكونات في باكسلوفيد ؟

**المادة الفعالة:** نيرماتريلفير وريتونافير

**المكونات غير الفعالة نيرماتريلفير:** ثاني أكسيد السيليكون الغرواني، الصوديوم كروسكارميلوز، مونوهيدرات اللاكتوز، السليلوز الجريزوفولفين، وصوديوم ستيريل فومارات. يحتوي طلاء الفيلم على: هيدروكسي بروبيل ميثيل سلولوز، أكسيد الحديد الأحمر، بولي إيثيلين جلايكول، وثاني أكسيد التيتانيوم.

**مكونات ريتونافير غير الفعالة:** فوسفات الكالسيوم ثنائي القاعدة اللامائي ، وثاني أكسيد السيليكون الغرواني، وكوبوفيدون، وصوديوم ستيريل فومارات، وسوربيتان مونولاتر. قد يحتوي طلاء الفيلم على: السيليكا الغروية اللامائية، وثاني أكسيد السيليكون الغرواني، وهيدروكسي بروبيل سلولوز، وهيدرومیلوز، وبولي إيثيلين جلايكول، وبوليسوربات 80، والتلك، وثاني أكسيد التيتانيوم.

معلومات إضافية  
للأسئلة العامة، قم بزيارة الموقع الإلكتروني أو اتصل برقم الهاتف الموضح أدناه.

رقم الهاتف	الموقع الإلكتروني
1-877-219-7225 (1-877-C19-PACK)	<a href="http://www.COVID19oralRx.com">www.COVID19oralRx.com</a> 



Distributed by  
**Pfizer Labs**  
Division of Pfizer Inc.  
New York, NY 10001

LAB-1494-9.3b

تمت المراجعة: 05/2023