

علاجات كوفيد – 19 للمرضى في العيادات الخارجية

عندما تكون الأعراض معتدلة ، يمكن أن يقلل علاج كوفيد-19 إلى حد كبير من خطر الإصابة بفيروس كوفيد-19 الشديد. تساعدك هذه العلاجات على التحسن بشكل أسرع وتجنب الحاجة إلى دخول المستشفى. تتوفر هذه العلاجات في Mass General Brigham وفي [مواقع العلاج التابعة لإدارة الصحة العامة في ولاية ماساتشوستس](#).

المرضى المعرضون لخطر متزايد للإصابة بكوفيد-19 مؤهلون. حوالي 40 ٪ من جميع مرضى Mass General Brigham لديهم ظروف خطيرة متزايدة وهم مؤهلون.

يرجى الاطلاع أدناه للحصول على تفاصيل إضافية بشأن خيارات العلاج في العيادات الخارجية لكوفيد-19

العلاجات الفموية المضادة لفيروس كوفيد – 19 (Paxlovid)

ما هو العلاج المضاد للفيروسات عن طريق الفم Paxlovid؟
يتم تناول العلاجات المضادة للفيروسات عن طريق الفم لعلاج الأعراض الخفيفة إلى المتوسطة لكوفيد-19 (COVID-19). أصدرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) تصاريح استخدام طارئ (EUs) لـ [Paxlovid من شركة Pfizer](#) (أقراص nirmatrelvir) وأقراص (ritonavir). يبطئ هذا الدواء من قدرة كوفيد-19 (COVID-19) على التكاثر.

متى يتم استخدام Paxlovid ؟
يتم استخدامه للمرضى الذين يعانون من أعراض كوفيد-19 (COVID-19). إنه غير متوفر للمرضى الذين تعرضوا لـ كوفيد-19 (COVID-19) ولكن لم يصابوا بالفيروس.

كيف يتم إعطاء هذا العلاج؟
Paxlovid هو حبة تؤخذ عن طريق الفم. وهي متوفرة بوصفة طبية فقط.

متى يجب أن يعطى؟
يجب إعطاء Paxlovid خلال 5 أيام من بداية الأعراض.

هل يمكنني الحصول على Paxlovid إذا تلقيت اللقاح ثم أصبت بكوفيد-19 (COVID-19)؟
نعم. يتوفر العلاج المضاد للفيروسات عن طريق الفم للمرضى الذين حصلوا على اللقاح و الذين لم يحصلوا على اللقاح بعد.

إذا لم أحصل على اللقاح ، هل يمكنني الحصول على هذا العلاج؟
نعم. يمكن أن يساعدك العلاج المضاد للفيروسات أيضاً.

ما مدى فعالية هذه العلاجات المضادة للفيروسات عن طريق الفم؟
في التجارب السريرية ، قلل Paxlovid من فرص الحاجة إلى دخول المستشفى بحوالي 90٪.

من هو مؤهل للحصول على Paxlovid ؟
يتوفر علاج Paxlovid للمرضى الذين تبلغ أعمارهم 12 عامًا فما فوق والذين:

- يزنون 40 كجم على الأقل (ما يزيد قليلاً عن 88 رطلاً) و
- تأكدوا من الإصابة بكوفيد-19 (COVID-19) عن طريق فحص المستضد أو اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل و

- لديهم أعراض مرض كوفيد-19 (COVID-19) و
 - يكونون خلال 5 أيام من بدء الأعراض
 - لديهم [حالة](#) صحية تجعلهم أكثر عرضة للإصابة بعدوى كوفيد-19 (COVID-19) الشديدة.
- هل Paxlovid مكلف بالنسبة لي؟
لا ، لقد تم توفير Paxlovid مجانًا من قبل حكومة الولايات المتحدة ويمكنك الحصول عليه بدون تكلفة.

كيف أحصل على Paxlovid إذا كنت مصابًا بكوفيد-19 (COVID-19) ؟
إذا كنت تعتقد أنك قد تكون مؤهلاً للعلاج ، فيرجى الاتصال بمقدم الرعاية الأولية أو الأخصائي. يمكنهم إحالتك للعلاج.

بالنسبة لسكان ماساتشوستس ، يوجد أيضًا برنامج رعاية صحية عن بُعد مجاني للحصول على علاج Paxlovid عن طريق الفم. يتم تقديم هذا من خلال إدارة الصحة العامة. يمكنك البدء على [موقعهم الإلكتروني](#). ساعات العمل من 8 صباحًا إلى 10 مساءً يوميًا. تتوفر خدماتهم باللغات [الإنجليزية](#) و [الإسبانية](#) و [الكريولية الهايتية](#) و [البرتغالية](#). تعرف على مزيد من المعلومات حول أهلية البرنامج و Paxlovid على موقع mass.gov الإلكتروني.

:Remdesivir

ما هو Remdesivir ؟

Remdesivir هو دواء معتمد من إدارة الأغذية والدواء (FDA) يتدخل في كيفية تكاثر فيروس كوفيد-19 (COVID-19). يمكن أن يساعد الأشخاص المصابين بكوفيد-19 (COVID-19) على التعافي بشكل أسرع ويقلل من فرص الإصابة بفيروس كوفيد-19 (COVID-19) الحاد. يمكن استخدامه أيضًا لعلاج المرضى في المستشفى ، لكننا هنا نركز استخدامه لمنع دخول المستشفى. تتوفر [إرشادات علاج كوفيد-19 \(COVID-19\) من المعاهد الوطنية للصحة \(NIH\)](#) معلومات حول هذا الدواء.

كيف يتم إعطاء Remdesivir ؟

يتم إعطاء Remdesivir عن طريق 3 دفعات وريدية (IV) يوميًا. إنها ليست حبة دواء.

متى يجب إعطاء Remdesivir ؟

يعمل Remdesivir بشكل أفضل عند إعطائه مبكرًا على الأقل خلال الأيام السبعة الأولى من [الأعراض](#). إذا كنت تتحسن بالفعل ، فربما لا يكون العلاج ضروريًا.

هل يمكنني الحصول على علاج Remdesivir إذا تلقيت اللقاح ثم أصبت بكوفيد-19 (COVID-19) ؟

يمكنك الحصول على Remdesivir إذا تم تلقيحك ضد كوفيد-19 (COVID-19). يجب أن تفي بمعايير الأهلية.

إذا لم اتلق اللقاح ، هل يمكنني الحصول على علاج Remdesivir ؟

يمكنك الحصول على Remdesivir إذا لم يتم تطعيمك. يجب أن تفي بمعايير الأهلية.

ما مدى جودة علاج Remdesivir ؟

لقد ثبت أن Remdesivir يقلل من فرصة دخول المستشفى بنسبة 82٪ ويساعد الناس على التحسن بشكل أسرع.

من هو المؤهل للحصول على هذا العلاج ؟

- يتوفر Remdesivir للمرضى الذين تبلغ أعمارهم 12 عامًا فما فوق على ان يكون:
- الوزن 40 كجم على الأقل و
- تم التأكد من الإصابة بكوفيد-19 (COVID-19) عن طريق اختبار المستضد أو اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل و
- هناك اعراض لكوفيد-19 (COVID-19)



- خلال 7 أيام من بدء الأعراض و
- هناك حالة صحية تجعلهم أكثر عرضة للإصابة بعدوى بكوفيد-19 (COVID-19) الشديدة.

هل Remdesivir مكلف بالنسبة لي؟

هذا يعتمد. لم تعد حكومة الولايات المتحدة تقدم Remdesivir مجاناً وستتم محاسبة التأمين الخاص بك على المصاريف. قد تحتاج إلى الدفع مقابل المدفوعات المشتركة أو الخصومات حسب التأمين الخاص بك. يمكن الحصول على Remdesivir مجاناً في [مواقع العلاج التابعة لإدارة الصحة العامة في ماساتشوستس](#).

كيف أحصل على Remdesivir إذا كنت مصاباً بكوفيد-19 (COVID-19) ؟

إذا كنت تعتقد أنك قد تكون مؤهلاً ، فيرجى الاتصال بمقدم الرعاية الأولية أو المتخصص. يمكنهم إحالتك للعلاج. يرجى ملاحظة أنه بسبب العرض المحدود ، لن يتمكن جميع المرضى الذين تم تحويلهم من تلقي العلاج.

لا تذهب إلى الرعاية العاجلة أو غرفة الطوارئ أو لأي من هذه العلاجات. لن تكون متوفرة في تلك الأماكن. هناك عيادات محددة مصممة لتقديم هذا العلاج.

لقد تم تحويلي للحصول على هذا العلاج ، ماذا سيحدث بعد ذلك؟

لدينا كميات محدودة من Remdesivir متاحة. إذا كنت قادراً على الحصول على العلاج ، فستصل بك لإبلاغك بالمعلومات والتعليمات. بالنسبة للمرضى الموجودين على بوابة المريض Patient Gateway ، سنرسل رسالة على بوابة المريض Patient Gateway إذا قررنا أنه لا يمكننا تقديم العلاج.

الأجسام المضادة وحيدة النسيلة (mAb) – Bebtelovimab :

ما هي الأجسام المضادة وحيدة النسيلة؟

أصدرت إدارة الغذاء و الدواء الأمريكية (FDA) ترخيصاً للاستخدام في حالات الطوارئ (EUA) للعديد من الأجسام المضادة وحيدة النسيلة. يمكن أن تساعد هذه الأجسام المضادة جهاز المناعة على الاستجابة لمحاربة الفيروس. توفر [إرشادات علاج كوفيد-19](#) (Covid-19) من المعاهد الوطنية للصحة معلومات حول هذه الأدوية.

ما هو Bebtelovimab ؟

Bebtelovimab هو الجسم المضاد الوحيد النسيلة الفعال ضد المتغير الفرعي لكوفيد-19 (COVID-19) BA.2 Omicron. يتم استخدامه للمرضى الذين يعانون من [أعراض كوفيد-19](#) (COVID-19). Bebtelovimab غير متاح للمرضى الذين تعرضوا لكوفيد-19 (COVID-19) ولكن لم يصابوا بالفيروس.

كيف يتم إعطاء Bebtelovimab ؟

يُعطى Bebtelovimab بالحقن الوريدي (وليس حبة).

متى يجب إعطاء Bebtelovimab ؟

يكون العلاج بالأجسام المضادة وحيدة النسيلة هو الأفضل عند إعطائه خلال الأيام القليلة الأولى من [الأعراض](#). إذا كانت الأعراض تتحسن بالفعل ، فمن المحتمل ألا يكون العلاج ضرورياً.

هل يمكنني تلقي العلاج بالأجسام المضادة أحادية النسيلة إذا تلقيت اللقاح ثم أصبت بكوفيد-19 (COVID-19) ؟؟

قد تكون قادراً على تلقي العلاج بالأجسام المضادة وحيدة النسيلة إذا حصلت على اللقاح ضد كوفيد-19 (COVID-19). يجب أن تستوفي معايير الأهلية.

إذا لم احصل على اللقاح ، فهل يمكنني الحصول على العلاج بالأجسام المضادة وحيدة النسيلة؟

قد تحصل على هذا العلاج إذا لم تحصل على اللقاح. يجب أن تستوفي معايير الأهلية.



ما مدى فعالية العلاج بالأجسام المضادة وحيدة النسيلة؟
ثبت أن العلاج بالأجسام المضادة وحيدة النسيلة يقلل من خطر دخول المستشفى لدى المرضى المعرضين لخطر الإصابة بفيروس كوفيد-19 (COVID-19) الشديد عند إعطائهم مبكرًا في عدوى كوفيد-19 (COVID-19) المصحوبة بأعراض. وجدت التجارب انخفاضًا في مخاطر دخول المستشفى بنسبة تصل إلى 70% إلى 90% مع العلاجات الأخرى وحيدة النسيلة مقارنة مع عدم وجود علاج. لا توجد بيانات متاحة حتى الآن حول تأثير bebtelovimab على خطر الاستشفاء أو الوفاة. ومع ذلك ، أظهرت الاختبارات المعملية أن bebtelovimab فعال ضد كل من متغير omicron و المتغير الفرعي لكوفيد-19 (COVID-19) BA.2 Omicron

من هو مؤهل للحصول على هذا العلاج؟

يتوفر علاج Bektelovimab للمرضى الذين تبلغ أعمارهم 12 عامًا فما فوق والذين:

- يزنون 40 كجم على الأقل (ما يزيد قليلاً عن 88 رطلاً) و
- تأكدوا من الإصابة بكوفيد-19 (COVID-19) عن طريق فحص المستضد أو اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل و
- لديهم أعراض مرض كوفيد-19 (COVID-19) و
- يكونون خلال 7 أيام من بدء الأعراض
- لديهم **حالة صحية** تجعلهم أكثر عرضة للإصابة بعدوى كوفيد-19 (COVID-19) الشديدة.

هل Bektelovimab مكلف بالنسبة لي؟

هذا يعتمد. يتم توفير Bektelovimab مجانًا من قبل حكومة الولايات المتحدة ولكن قد يتم احتساب تكلفة الحقن على شركة التأمين الخاصة بك. قد تحتاج إلى الدفع مقابل المدفوعات المشتركة أو الخصومات حسب التأمين الخاص بك. يمكن الحصول على Bektelovimab مجانًا في [مواقع العلاج التابعة لإدارة الصحة العامة في ولاية ماساتشوستس](#).

كيف أحصل على Bektelovimab إذا كنت مصابًا بكوفيد-19 (COVID-19) ؟

تتوفر هذه العلاجات في Mass General Brigham وفي مواقع العلاج التابعة لإدارة الصحة العامة في ولاية ماساتشوستس. كلا الموقعين خيارات ممتازة للعلاج. إذا كنت تعتقد أنك قد تكون مؤهلاً للعلاج ، فيرجى الاتصال بمقدم الرعاية الأولية أو الأخصائي. يمكنهم إحالتك للعلاج.

لا تذهب إلى قسم الرعاية العاجلة أو غرفة الطوارئ لأي من هذه العلاجات. لم تكن متوفرة في تلك المواقع. هناك عيادات محددة مصممة لتقديم هذا العلاج.

لقد تم تحويلي للحصول على هذا العلاج. ماذا يحدث بعد ذلك؟

إذا كنت قادرًا على الحصول على العلاج ، فسوف نتصل بك لإبلاغك بالمعلومات والتعليمات. بالنسبة للمرضى الموجودين على بوابة المريض Patient Gateway ، سنرسل رسالة خلال بوابة المريض Patient Gateway إذا قررنا أنه لا يمكننا تقديم العلاج. إذا لم تكن مسجلًا في بوابة المريض Patient Gateway ، [فيمكنك التسجيل هنا](#).

إذا قام مقدم الرعاية الخاص بك بإحالتك إلى مواقع العلاج التابعة لإدارة الصحة العامة ، فستتلقى مكالمة إذا كان من الممكن استقبالك. لا يتصلون حاليًا بالمرضى أو Mass General Brigham إذا لم تتمكن من الحصول على العلاج.

Evusheld:

ما هو Evusheld ؟

Evusheld / Cilgavimab (Evusheld) هو مزيج من الأجسام المضادة يستخدم للوقاية من كوفيد-19 (COVID-19) في الأشخاص الذين لا يمكن أن يتمتعوا بالحماية الكافية عن طريق اللقاح. أصدرت إدارة الدواء و الغذاء الأمريكية (FDA) ترخيصًا لاستخدام Evusheld في حالات الطوارئ (EUA). يحتوي هذا الدواء على أجسام مضادة وحيدة النسيلة يمكن أن تساعد جهاز المناعة على الاستجابة لمحاربة الفيروس. يتم استخدامه لتقليل خطر الإصابة بعدوى كوفيد-19 (COVID-19) في المرضى الذين



يعانون من ضعف في جهاز المناعة. انها ليست بديلاً عن اللقاح. كما أنه لا يستخدم لعلاج عدوى كوفيد-19 (COVID-19). توفر الإرشادات العلاجية لكوفيد-19 (COVID-19) من المعاهد الوطنية للصحة معلومات حول هذا الدواء

كيف يتم إعطاء Evusheld؟

يتم إعطاء Evusheld عن طريق الحقن. انها ليست حبة.

من هو المؤهل للحصول على هذا العلاج؟ يتوفر Evusheld للمرضى الذين تبلغ أعمارهم 12 عامًا فما فوق والذين:

- يزنون 40 كجم على الأقل (ما يزيد قليلاً عن 88 رطلاً) و
- لا يعانون من إصابة حالية أو لم يتعرضوا مؤخراً لفيروس كوفيد-19 (COVID-19) و
- حاصلين على اللقاحات لكوفيد-19 (COVID-19) (ما لم يكن هناك سبب طبي يمنع التطعيم ، مثل الحساسية الشديدة) و
- لديهم جهاز مناعي ضعيف ، وبالتالي ، قد يكون لديهم استجابة مناعية غير كافية للقاح ضد كوفيد-19 (COVID-19)

كم مرة يجب أن يعطى Evusheld؟

يوصى حالياً بتكرار الجرعة فقط إذا تلقيت سابقاً جرعة أقل (150 مجم من كل جسم مضاد) من Evusheld. إذا تلقيت Evusheld قبل 28 فبراير ، فقد تلقيت هذه الجرعة المنخفضة. يجب أن تتلقى جرعة إضافية لزيادة الفعالية ضد متحورات أوميكرون الفرعية. إذا كنت تعتقد أنك قد تلقيت جرعة أقل من Evusheld ولم تتلق جرعة إضافية بعد ، فيرجى الاتصال بطبيبك.

تراقب إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) مدة الحماية ومن المتوقع أن تصدر توصيات بشأن الجرعات الكاملة الثانية في وقت ما قبل الصيف.

هل يمكنني الحصول على Evusheld إذا حصلت على اللقاح؟

نعم. يجب أن يتم إعطائك اللقاح بالكامل قبل تلقي Evusheld. من الجدير بالذكر أنه يجب إعطاء Evusheld بعد أسبوعين على الأقل من تلقي اللقاح.

هل يمكنني الحصول على Evusheld إذا لم احصل على اللقاح؟

لا ، Evusheld ليس بديلاً عن لقاح كوفيد-19 (COVID-19). لن يتم استخدامه للأشخاص الذين لم يتلقوا اللقاح الذين يتوقع أن يكون لديهم استجابة مناعية كافية للقاح. الاستثناء الوحيد هو وجود سبب طبي ضد الحصول على اللقاح (على سبيل المثال: تاريخ من رد فعل تحسسي شديد للقاح كوفيد-19 (COVID-19)).

ما مدى جودة عمل Evusheld؟

ليس معروفاً حقاً إذا كان يعمل Evusheld جيداً في الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة. ثبت أن Evusheld يقلل من فرصة الإصابة بنسبة 77 ٪ في دراسة واحدة لدى الأشخاص الذين لديهم جهاز مناعة طبيعي. من المتوقع أن يوفر Evusheld الحماية ضد متحور أوميكرون BA.2.

هل أحتاج إلى أكثر من جرعة واحدة من Evusheld؟

لم يُعرف بعد كم مرة ستحتاج إلى الحصول على جرعات لاحقة من Evusheld. لا تزال إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) تحدد الجدول الزمني ولكن من المحتمل أن يتم ذلك كل 3 إلى 6 أشهر. إذا تلقيت Evusheld قبل 28 فبراير 2022 ، فقد تحتاج إلى الحصول على جرعة إضافية لتوفير حماية أفضل ضد متحور أوميكرون.

كيف أحصل على علاج Evusheld؟

إذا كنت تعتقد أنك قد تكون مؤهلاً ، فيرجى الاتصال بمقدم الرعاية الأولية أو المتخصص. يمكنهم إحالتك لتلقي Evusheld.

يرجى ملاحظة أن Evusheld لا يستخدم لعلاج كوفيد-19 (COVID-19). يتم استخدامه لتقليل خطر الإصابة بعدوى كوفيد-19 (COVID-19) في المرضى الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة.



لا تذهب إلى الرعاية العاجلة أو غرفة الطوارئ أو الرعاية العاجلة لعلاج Evusheld ؛ إنه غير متوفر في تلك المواقع. هناك عيادات محددة مصممة لتقديم هذا العلاج.

لقد تم تحويلي للحصول على هذا العلاج ، ماذا سيحدث بعد ذلك؟

إذا يمكنك الحصول على العلاج ، فستصل بك لإبلاغك بالمعلومات والتعليمات. بالنسبة للمرضى الموجودين على بوابة المريض Patient Gateway ، سنرسل رسالة على بوابة المريض Patient Gateway إذا قررنا أنه لا يمكننا تقديم العلاج.

من المؤهل للحصول على هذه العلاجات؟

لتلقي العلاج في العيادة الخارجية لـ كوفيد-19، يجب أن يكون لديك كوفيد-19 مؤكدًا إما عن طريق اختبار المستضد أو PCR. يجب أيضًا أن تكون مصابًا بحالة صحية تجعلك أكثر عرضة للإصابة بعدوى كوفيد-19 الشديدة. يتم إعطاء الأولوية للمرضى للعلاجات المتاحة بناءً على خطر إصابتهم بفيروس كوفيد-19 الشديد.

تشمل الحالات عالية الخطورة للإصابة بفيروس كوفيد-19 الشديد ما يلي: الخضوع لعلاج السرطان ، أو تناول الأدوية حاليًا للزراعة، أو الأدوية المثبطة للمناعة لحالات أخرى. الحالات الأخرى عالية الخطورة، بما في ذلك الإصابة بأمراض الرئة أو الكلى أو الكبد المزمنة ؛ داء السكري؛ فيروس نقص المناعة البشرية؛ بدانة؛ وعمر 65 عامًا أو أكثر ، قد يعرضك مسبقًا لأعراض أسوأ من كوفيد-19 أو الأنفلونزا. [تعرف على المزيد حول الظروف الصحية المهنية من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها \(CDC\).](#)

تم التحديث في 2022/06/06

