

علاج مرضى كوفيد-19 في العيادات الخارجية

يمكن أن يؤدي العلاج الخارجي والعلاجات الخاصة بمرض كوفيد-19 إلى تقليل خطر الإصابة بمرض كوفيد-19 الشديد بشكل كبير.

إن علاج مرض كوفيد-19 عندما تكون الأعراض خفيفة يمكن أن يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بمرض كوفيد-19 الشديد ويساعدك على التحسن بشكل أسرع. تتوفر هذه العلاجات في Mass General Brigham وفي [مواقع العلاج التابعة لقسم الصحة العامة في Massachusetts](#).

[المرضى المعرضون لخطر متزايد](#) للإصابة بمرض كوفيد-19 الشديد مؤهلون لتلقي العلاج. ننصح بشدة المرضى الذين يعانون من [حالات طبية](#) متعددة أو الذين لم يتم تطعيمهم أو لم يتم تحديث لقاحاتهم بالسؤال عن العلاج.

يرجى الاطلاع أدناه للحصول على تفاصيل إضافية بشأن خيارات العلاج للمرضى الخارجيين المصابين بمرض كوفيد-19. [تتوفر لدى مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية \(CDC\) منها معلومات حول خيارات العلاج للمرضى الخارجيين](#).

العلاجات المضادة للفيروسات عن طريق الفم لمرض كوفيد-19- Paxlovid و Lagevrio

يتم تناول العلاجات المضادة للفيروسات عن طريق الفم لعلاج الأعراض الخفيفة إلى المتوسطة لمرض كوفيد-19. تمت الموافقة رسميًا على Paxlovid من قبل إدارة الغذاء والدواء (FDA) في 25 مايو/ أيار 2023. أصدرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ترخيص الاستخدام الطارئ (EUA) لدواء [Lagevrio \(molnupiravir\)](#). كلا الدواءين علاج فعال لعدوى كوفيد-19.

متى يتم استخدام Paxlovid و Lagevrio؟

يستخدم دواء Paxlovid و Lagevrio لعلاج المرضى الذين يعانون من أعراض مثل سيلان الأنف أو السعال أو التهاب الحلق من مرض كوفيد-19. لا يتم استخدامها للوقاية، أي للمرضى الذين تعرضوا لفيروس كوفيد-19 ولكن لم يصابوا بالفيروس. يُعتبر دواء Paxlovid أكثر فعالية إلى حد ما، على الرغم من أنه في بعض الأحيان بسبب تفاعلات الأدوية، أو مشاكل أخرى، يجب استخدام دواء Lagevrio.

لا يمكن الحصول على Paxlovid و Lagevrio إلا إذا كنت مصابًا بـ كوفيد-19. لا يجوز لفريقك الطبي وصف هذه الأدوية "فقط في حالة" حصولك على نتيجة إيجابية لاختبارك أثناء الرحلة أو في وقت آخر قد يكون مفيدًا فيه.

متى يتم استخدام Paxlovid و Lagevrio؟

يعتبر كلا من Paxlovid و Lagevrio عبارة عن حبوب تؤخذ عن طريق الفم مرتين يوميًا لمدة 5 أيام. إنها متاحة بوصفة طبية فقط.

متى يجب إعطاء Paxlovid أو Lagevrio؟

ينبغي تناول Paxlovid و Lagevrio فور ظهور الأعراض. لا يمكن البدء بها إلا خلال الأيام الخمسة الأولى من ظهور الأعراض. إذا كانت أعراضك قد تحسنت بالفعل، فقد لا يكون العلاج ضروريًا.

هل يمكنني الحصول على Paxlovid أو Lagevrio إذا تم تطعيمي ثم أصبت بكوفيد-19؟

نعم. تتوفر هذه العلاجات لكل شخص مصاب بعدوى كوفيد-19 والمعرض لخطر الإصابة بمرض شديد.

إذا لم أتلقى التطعيم، هل يمكنني الحصول على Paxlovid أو Lagevrio؟

نعم. تكون العلاجات المضادة للفيروسات مفيدة بشكل خاص إذا لم يتم تطعيمك.

ما مدى فعالية هذه العلاجات المضادة للفيروسات عن طريق الفم؟
توصل باحثون في Mass General Brigham ومستشفيات أخرى إلى أن عقار Paxlovid يقلل من فرص دخول المستشفى أو الوفاة بسبب كوفيد-19 بنسبة تتراوح بين 45% و80%. يقلل دواء Lagevrio من فرص دخول المستشفى أو الوفاة بسبب كوفيد-19 بنحو 30% ويقصر مدة المرض من 3 إلى 5 أيام. لدينا الآن معلومات أقل حول تطعيم الناس على نطاق واسع، لكن كلا اللقاحين فعالان.

من هو المؤهل للحصول على Paxlovid؟

يتوفر علاج Paxlovid للمرضى الذين تتراوح أعمارهم بين 12 عامًا وأكبر والذين:

- يزنون ما لا يقل عن 40 كجم (ما يزيد قليلاً عن 88 رطلاً) و
- لديهم أعراض كوفيد-19 و
- يكونون خلال 5 أيام من بداية الأعراض و
- يعانون من منحالة صحية تجعلهم أكثر عرضة للإصابة بعدوى كوفيد-19 الشديدة.

يمكن أن يتفاعل Paxlovid مع أدوية أخرى. يرجى إبلاغ فريق الرعاية الخاص بك بجميع الأدوية والمكملات الغذائية التي تتناولها.

لا ينبغي استخدام Paxlovid دون مناقشة محددة مع فريق الرعاية الخاص بك إذا كنت:

- أجريت عملية زرع ويجب أن تتناول tacrolimus أو cyclosporine أو everolimus أو sirolimus
- لديك مرض شديد في الكلى أو الكبد
- تتطلب بعض الأدوية المضادة للتخثر (rivaroxaban ، clopidogrel، أو غيرها)
- تناول العديد من أدوية العلاج الكيميائي
- تناول عشبة سانت جون

هناك خيارات فعالة أخرى للمرضى المصابين بفيروس كوفيد-19 والذين لا يستطيعون تناول Paxlovid. اتصل بفريق الرعاية الخاص بك لفهم الخيار الأفضل لك.

من هو المؤهل للحصول على Lagevrio؟

يتوفر علاج Lagevrio للمرضى الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا أو أكثر والذين:

- لديك أعراض مرض كوفيد-19 و
- يكونوا خلال 5 أيام من بداية الأعراض و
- ليسوا حوامل و
- يعانون من منحالة صحية تجعلهم أكثر عرضة للإصابة بعدوى كوفيد-19 الشديدة.

يرجى ملاحظة: يرجى ملاحظة: هناك بعض الاعتبارات الإضافية للمرضى وشركائهم القادرين على الحمل. يرجى مراجعة طبيبك حول الحاجة إلى وسائل منع الحمل.

هل هذه الأدوية باهظة الثمن بالنسبة لي؟

في البداية، كانت هذه الأدوية مغطاة من قبل حكومة الولايات المتحدة، لكنها الآن يتم توزيعها تجارياً، مما يعني أنه يمكنك دفع مبلغ كبير مقابل هذه الأدوية. هناك بعض البرامج التي قد تساعدك في دفع تكاليف Paxlovid إذا كان لديك مبلغ مشاركة مرتفع.

كيف أحصل على Paxlovid أو Lagevrio إذا كنت مصاباً بكوفيد-19؟

إذا كنت تعتقد أنك قد تكون مؤهلاً لتلقي العلاج، فيرجى الاتصال بفريق الرعاية الأولية أو فريق الرعاية التخصصية الخاص بك. ويمكنهم وصف العلاج.

بالنسبة لسكان ماساتشوستس، هناك أيضاً برنامج مجاني للرعاية الصحية عن بُعد للحصول على علاج كوفيد-19 عن طريق الفم. يتم تقديم هذا من خلال وزارة الصحة العامة. يمكنك البدء على موقعهم الإلكتروني. ساعات العمل من الساعة 8 صباحاً إلى الساعة 10 مساءً يوميًا. خدماتهم متاحة باللغات الإنجليزية الإسبانية الكريولية الهايتية البرتغالية. تعرف على المزيد من المعلومات حول أهلية البرنامج و Paxlovid على موقع [mass.gov](https://www.mass.gov).

Remdesivir

Remdesivir هو دواء معتمد من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية يتداخل مع كيفية تكاثر فيروس كوفيد-19. يمكن أن يساعد الأشخاص المصابين بفيروس كوفيد-19 على التعافي بشكل أسرع ويقلل من فرص الإصابة بمرض كوفيد-19 الشديد.

كيف يتم إعطاء Remdesivir؟

يتم إعطاء عقار Remdesivir عن طريق ثلاث دفعات وريدية يوميًا. إنها ليست حبة دواء.

متى يجب إعطاء Remdesivir؟

يعمل عقار Remdesivir بشكل أفضل عند إعطائه في وقت مبكر على الأقل خلال الأيام السبعة الأولى من [ظهور الأعراض](#). إذا كنت تتحسن بالفعل، فمن المحتمل أن العلاج ليس ضروريًا.

هل يمكنني الحصول على علاج Remdesivir إذا تم تطعيمي ثم أصبت بكوفيد-19؟ ماذا لو لم يتم تطعيمي؟
يمكنك الحصول على عقار Remdesivir سواء كنت قد حصلت على لقاح كوفيد-19 أم لم تحصل عليه. يجب أن تستوفي معايير الأهلية.

ما مدى جودة علاج Remdesivir؟

لقد ثبت أن عقار Remdesivir يقلل من فرصة دخول المستشفى بنسبة 82% ويساعد الأشخاص على التحسن بشكل أسرع.

من هم المؤهلون للحصول على Remdesivir؟

يتوفر عقار Remdesivir للمرضى الذين تبلغ أعمارهم 12 عامًا أو أكثر والذين:

- الوزن لا يقل عن 40 كجم
- لديهم أعراض كوفيد-19 و
- يكون خلال 7 أيام من بداية الأعراض
- يعانون من [منحالة صحية](#) تجعلهم أكثر عرضة للإصابة بعدوى كوفيد-19 الشديدة.

هل Remdesivir باهظ الثمن بالنسبة لي؟

في البداية، كانت الحكومة الأمريكية تغطي تكاليف هذا الدواء، ولكن الآن يتم توزيعه تجاريًا، لذا قد يكون لديك دفع مبلغ إضافي كبير

كيف أحصل على Remdesivir إذا كنت مصابًا بكوفيد-19؟

إذا كنت تعتقد أنك قد تكون مؤهلاً، فيرجى الاتصال بمقدم الرعاية الأولية أو المتخصص الخاص بك. ويمكنهم إحالتك إلى العلاج. يرجى ملاحظة أنه بسبب العرض المحدود للأماكن لتوفير العلاج الوريدي، فلن يتمكن جميع المرضى المحالين من تلقي العلاج. لا تذهب إلى الرعاية العاجلة أو غرفة الطوارئ أو لأي من هذه العلاجات. إنها غير متوفرة في تلك المواقع. هناك عيادات خاصة مصممة لتقديم هذا العلاج.

لقد تم إحالتني لهذا العلاج. ماذا يحدث بعد ذلك؟

تتوفر لدينا كميات محدودة من عقار Remdesivir. إذا كنت قادرًا على الحصول على العلاج، فسنقوم بالاتصال بك لتزويدك بالمعلومات والإرشادات بالنسبة للمرضى المتواجدين على بوابة المريض Patient Gateway، سوف نرسل رسالة بوابة المريض Patient Gateway إذا قررنا أننا لا نستطيع تقديم العلاج. إذا لم تتمكن من الوصول إلى عقار remdesivir، فقد ترغب في تناول أحد العلاجات على شكل حبوب، المذكورة أعلاه.

تم التحديث في 20 ديسمبر / كانون الأول 2024