Mass General Brigham

مكتب كبير المسؤولين الطبيين

لقاح كوفيد-19

اكتشف أين يمكنك الحصول على لقاح كوفيد-19 في Mass General Brigham وفي المجتمع.

إرشادات محدثة بشأن لقاح كوفيد-19

يعد التطعيم أفضل طريقة للوقاية من المرض وتقليل خطر الإصابة بالأمراض الشديدة والاستشفاء. عندما تحصل على التطعيم، فإنك تحمي أيضًا الأشخاص من حولك، بما في ذلك الأشخاص الأكثر عرضة لخطر حدوث مضاعفات لأمراض الجهاز التنفسي.

- توصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية (CDC) منها بأن يحصل كل شخص يبلغ من العمر 6 أشهر أو أكثر على جرعة من لقاح كوفيد-19 المحدث لعام 2024-2025.
- قد يحتاج الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر إلى 4 سنوات إلى جرعات متعددة من لقاحات كوفيد-19 للبقاء محدثين. راجع التوصيات المحددة على موقع مراكز السيطرة على الأمراض و الوقاية منها (CDC).
- يجب على الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا أو الذين يعانون من ضعف المناعة بدرجة متوسطة أو شديدة الحصول على جرعة إضافية من لقاح كوفيد-19 المحدث بعد 6 أشهر من تلقي الجرعة الأولى.

نحن نشجع المرضى على الاتصال بالصيدليات المحلية للحصول على اللقاح. إنهم يقدمون نفس اللقاحات الموجودة في عياداتنا. لا يجوز للصيدليات المحلية إعطاء هذا الدواء للأطفال الرضع والأطفال الصغار. يرجى الاتصال بمكتب طبيب الأطفال الخاص بطفلك إذا كنت تواجه أي مشكلة.
للعثور على صيدلية محلية للحصول على لقاح كوفيد-19، يمكنك الذهاب إلى vaccines.gov أو الاتصال على الرقم 1-800-232-0233. ستقدم العديد من مكاتب الرعاية الأولية والتخصصية في جميع أنحاء مستشفى Mass General Brigham لقاحات كوفيد-19 في زيارات المكتب المجدولة بانتظام. معظم عياداتنا لا تقوم بتحديد مواعيد خاصة باللقاحات فقط.

هل يجب أن يكون اللقاح المحدث الخاص بي من نفس العلامة التجارية التي تلقيتها في البداية، أم يمكنني "المزج والمطابقة"؟

تسمح توصيات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية (CDC) للبالغين الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا أو أكثر بتلقي نفس اللقاح المحدث أو لقاح مختلف عن لقاحهم الأصلي.

لقد أصبت بالفعل كوفيد-19. هل يجب أن أحصل على التطعيم؟

نعم، لا يزال يتعين عليك تلقي التطعيم إذا كنت قد أصبت بفيروس كوفيد-19 وتعافيت منه. إذا كنت قد أصبت مؤخرًا بفيروس كوفيد-19، فقد تفكر في تأخير جرعة اللقاح التالية لمدة 3 أشهر من:

- بدء الأعراض لديك.
- إذا لم تظهر عليك أي أعراض عند تلقيك اختبار كوفيد إيجابي لأول مرة.

إذا كان لديك أي أسئلة، قد يكون من الأفضل استشارة طبيبك. لمزيد من المعلومات، راجع موقع مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC).

حول لقاحات كوفيد-19 الحالية المسموح باستخدامها في حالات الطوارئ من قِبل إدارة الغذاء والدواء (FDA)

هل اللقاحات آمنة وفعالة؟

لن نوصي بأي لقاح لم يثبت أنه آمن وفعال. لقد أثبتت جميع لقاحات كوفيد-19 فعاليتها في الوقاية من المرض الشديد والاستشفاء والوفاة بسبب كوفيد-19. وكانت هذه النتائج متسقة عبر الجنس والعمر والعرق والانتماء العرقي.
يخضع كل لقاح لعملية مراجعة تنظيمية صارمة. نحن نراقب بشكل مستمر أي مخاوف سريرية أو تتعلق بالسلامة لجميع اللقاحات. لمزيد من المعلومات، راجع موقع مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC).

لقاحات فايزر Pfizer وموديرنا Moderna ضد كوفيد-19 هي لقاحات mRNA. ماذا يعني ذلك؟

على الرغم من أن لقاحات mRNA هي نوع جديد من اللقاحات، إلا أن الباحثين كانوا يدرسونها ويعملون عليها لسنوات عديدة. لا تحتوي على فيروسات حية ولا يمكن أن تسبب مرض كوفيد-19. وبدلاً من ذلك، فإنها تعطي لخلايانا توجيهات حول كيفية صنع بروتينات كوفيد-19 الموجودة على الطبقة الخارجية من فيروس

كورونا. ويمكن لجهاز المناعة لدينا بعد ذلك إنتاج أجسام مضادة لهذه البروتينات وحمايتنا من الإصابة بفيروس كوفيد-19. لا يدخل mRNA من اللقاحات أبدًا إلى نواة خلايانا أو يصل إلى حمضنا النووي. تتوفر لدى مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية (CDC) منها معلومات أكثر حول لقاحات mRNA.

كيف يعمل لقاح نوفافاكس Novavax؟

لقاح نوفافاكس Novavax هو لقاح مكون من وحدات بروتينية فرعية. تحتوي هذه اللقاحات على بروتينات (تسمى البروتين الشوكي) من الفيروس الذي يسبب مرض كوفيد-19. ويحتوي اللقاح على مكون آخر يساعد الجهاز المناعي على الاستجابة للبروتين الشوكي في المستقبل. عندما يعرف الجهاز المناعي كيفية الاستجابة البروتين الشوكي فإنه يمكن أن يستجيب بسرعة البروتين الشوكي للفيروس الفعلي ويحمي الناس من كوفيد-19. تم تطوير هذا النوع من اللقاحات قبل 30 عامًا وقد تم استخدامه لعلاج التهاب الكبد الوبائي ب والسعال الديكي.

تتوفر لدى مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية (CDC) منها معلومات إضافية حول لقاحات الوحدة البروتينية على موقعها الإلكتروني.

الحساسية

هل تسبب لقاحات كوفيد-19 ردود فعل تحسسية؟

وقد وردت بعض التقارير عن إصابة بعض الأشخاص بردود فعل تحسسية بعد تلقي التطعيم. أصيب عدد قليل من الأشخاص برد فعل تحسسي شديد يسمى الحساسية المفرطة. بناءً على ذلك، فإن الولايات المتحدة. وبناء على هذا، فتوصي إدارة الغذاء والدواء (FDA) ومراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) بأن الأشخاص الذين لديهم تاريخ من الحساسية المفرطة لأي من مكونات لقاح كوفيد-19 لا ينبغي أن يحصلوا على هذا اللقاح. يمكن للأشخاص الذين يعانون من حساسية تجاه الأطعمة أو الأدوية الأخرى أن يتلقوا التطعيم بأمان.
بشكل عام، يمكن لمعظم المرضى الذين يعانون من الحساسية تجاه أحد اللقاحات تلقي اللقاحات الأخرى بأمان. إذا كان لديك تاريخ من ردود الفعل التحسسية الشديدة تجاه اللقاحات أو العلاجات القابلة للحقن أو أي مكون من مكونات لقاح كوفيد-19، فيجب عليك التحدث إلى مقدم الرعاية الأولية أو أخصائي الحساسية (إذا كان لديك واحد). يمكن لمزود الخدمة الخاص بك أن يساعدك في تحديد ما إذا كان من الآمن الحصول على التطعيم.

اقرأ المزيد عن الآثار الجانبية المحتملة.

هل يمكنني الحصول على لقاحات كوفيد-19 إذا كان لدي حساسية تجاه الطعام أو الدواء؟

يمكنك تلقي لقاح كوفيد-19 إذا كان لديك حساسية تجاه الطعام أو الدواء. لا تحتوي لقاحات فايزر Pfizer وموديرنا Moderna ونوفافاكس Novavax ضد كوفيد-19 على الجيلاتين أو البيض أو المطاط.

من يجب عليه التحدث مع الطبيب قبل تلقي اللقاح؟

قد تكون استشارة الحساسية/المناعة مفيدة لك إذا كانت لديك المشكلات التالية:

- تاريخ سابق من حساسية اللقاحات مع ردود فعل مثل الحكة، الطفح الجلدي، الشرى، التورم/الوذمة الوعائية، الأزيز، ضيق التنفس، ضيق الصدر، أو التفاعل التحسسي الشديد (الصدمة التأقية).
- تاريخ من الحساسية تجاه البولي إيثيلين غليكول (PEG) أو البوليسوربات، مع ردود فعل مثل الحكة، الطفح الجلدي، الشرى، التورم / الوذمة الوعائية، الأزيز، ضيق التنفس، ضيق الصدر أو التفاعل التحسسي الشديد.
- رد فعل تحسسي على جرعة من لقاح كوفيد-19

الحمل والرضاعة الطبيعية، والخصوبة

يوصي مركز السيطرة على الأمراض (CDC) وأطباء الأطفال وأطباء أمراض النساء والتوليد لدينا بأن يتلقى الأشخاص الحوامل أو يخططون للحمل أو المرضعات لقاح كوفيد-19. يرجى الاطلاع على التوصيات الكاملة هنا.

الأطفال

توصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) بأن يتلقى الأطفال الذين تبلغ أعمارهم 6 أشهر فأكثر لقاح كوفيد-19 المحدث. تمت الموافقة على لقاحي فايزر Pfizer وموديرنا Moderna ويوصى بهما للمرضى في هذه الفئة العمرية.

يرجى الاطلاع على التفاصيل الكاملة على موقع مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC). إذا كانت لديك أسئلة حول لقاح طفلك، فيرجى الاتصال بمكتب طبيب الأطفال.

أين يمكنني الحصول على مزيد من المعلومات؟

- فوائد الحصول على لقاح كوفيد-19

- لقاح كوفيد-19 في ماساتشوستس
- لقاح كوفيد-19 في نيوهامبشير
- إدارة الغذاء والدواء: لقاح فايزر-بيونتيك Pfizer-BioNTech ضد كوفيد-19
- إدارة الغذاء والدواء: لقاح موديرنا Moderna ضد كوفيد-19
- لقاح نوفافاكس Novavax ضد كوفيد-19
- فهم لقاحات كوفيد-19 المعتمدة على mRNA
- اختبار Mass General Brigham | كوفيد-19

تم التحديث في 20 ديسمبر / كانون الأول 2024