




## Enfòmasyon sou Reyakson ak Sentòm Vaksen COVID-19 yo

Moun ka gen plizyè reyakson diferan parapò ak vaksen yo. Pifò reyakson yo lejè epi yo amelyore nan kèk èdtan oswa nan yon jou oswa de jou apre w fin pran vaksen w lan. Feyè sa a ba w yon apèsi sou reyakson ki posib yo.

Efè segondè ki komen yo			
Reyakson	Èske sa nòmal? Kisa m ta dwe fè?	Kilè m ta dwe enkyete m?	Pfizer/Moderna - Èske m ka pran vaksen sa a ankò?
Sentòm tankou lafyèv, frison, doulè nan misk, fatig, maltèt	<p>Sa nòmal. Sa ka kòmanse nan 24 èdtan apre w fin pran vaksen an. Li ka dire 2 oswa 3 jou.</p> <p>Ou ka pran asetaminofèn oswa ibipwofèn jan sa nesesè pou ede w jere sentòm sa yo.</p> 	<p><b>Si w PA yon anplwaye Mass General Brigham:</b> Si w gen youn nan sentom ki anba la a, tanpri kontakte founisè w pou plis konsèy, paske w ka bezwen fè yon tès COVID-19:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Yon fyèv ki wo</li> <li>• Sentòm ki dire <u>plis</u> pase kèk jou</li> <li>• Sentòm ki ka prezante akòz COVID-19 (tankou yon nouvo malgòj, tous, konjesyon nazal, nen k ap koule, pa ka pran sant oswa gou oswa souf kout).</li> <li>• Yon nouvo kontak ak yon moun ki gen COVID-19</li> </ul> <p>Si w gen yon konsiltasyon, yon pwosedi oswa yon chiriji ki planifye pou byento, epi w gen sentòm tanpri fè ekip swen w lan konn sa.</p> <p><b>Anplwaye Mass General Brigham yo gade nan paj 3.</b></p>	<p>Ou ka pran yon lòt dòz nan moman ki apwopriye a ak siveyans estanda 15 minit la.</p>
Woujè, anfleman ak/oswa demanjezon nan pati kote w pran vaksen an	<p>Sa nòmal. Li ka laj anpil. Jeneralman, sa dire 2 oswa 3 jou men li ka dire jiska 7 jou. Li ka kòmanse tou sou 7 a 10 jou apre w fin pran vaksen w lan. Ou ka gen anflamasyon anba zesèl nan bra kote w te pran vaksen an. Sa ta dwe amelyore poukont li nan lespas 7 jou.</p> <p>Si w gen demanjezon, ou ka pran yon antiyistamin (pa egzanp, diphenhydramine). Si w gen doulè, ou ka pran asetaminofèn. Glas ka ede pou anflamasyon an.</p> 	<p>Si woujè ak anflamasyon an rete nan menm pati kote w te pran vaksen an epi w pa gen okenn lòt sentòm reyakson alèjik (<b>gade nan paj 2 a</b>) lè sa a ou pa bezwen konsilte oswa pale ak pèsòn.</p> <p>Si w gen nenpòt sentòm alèjik tou, <b>gade nan paj 2</b> pou jwenn konsèy.</p> <p>Si anflamasyon anba zesèl ou a dire plis pase 7 jou, ou dwe kontakte pwofesyonèl swen sante w la.</p>	<p>Toutotan w pa gen okenn reyakson alèjik, ou ka resevwa yon lòt dòz vaksen nan moman ki apwopriye a. Ou ta dwe pran kèlkeswa dòz adisyonèl yo mande w la avèk siveyans estanda 15 minit la.</p>

## Reyaksyon alèjik

	Kisa sentòm yo ye?	Kilè m ta dwe enkyete m?	Pfizer/Moderna - Èske m ka pran vaksen sa a ankò?
Reyaksyon alèjik ki lejè	<ul style="list-style-type: none"> <li>Itikè, demanjezon, gratèl (sof kote w te pran vaksen an)           <ul style="list-style-type: none"> <li>Ou ka pran yon medikaman antiystamin yo vann san preskripsyon, pa egzanp, diphenhydramine oswa cetirizine jan yo rekòmande l sou etikèt ki sou anbalaj la.</li> </ul> </li> </ul>	<p>Si sa rive nan espas 4 èdtan aprè w fin vaksinen, tanpri kontake founisè w la</p> <p><b>*Anplwaye Mass General Brigham yo gade nan paj 3</b></p>	<p>Se yon doktè ki pou evalye w pou l detèmine si w ka pran yon lòt dòz nan moman ki apwopriye a. Ou ka petèt bezwen fè tès sou po.</p>
Reyaksyon alèjik ki grav (anafilaksi)	 <ul style="list-style-type: none"> <li>Po bouch, vizaj, zye, lang ki anfle</li> <li>Noze/vomisman oswa doulè nan vant</li> <li>Kontraksyon nan göj oswa difikilte pou vale</li> <li>Difikilte pou respire ki pèsiste oswa souf kout</li> <li>Tous oswa sifleman</li> <li>Tèt vire oswa toudisman</li> </ul>	<p>Pou majorite moun, sa rive jeneralman touswit apre yo fin pran vaksen an – nan lespas 15 minit. Y ap swiv ou nan klinik kote yo bay vaksen an pandan moman sa a.</p> <p>Si w gen sentom sa yo aprè w fin ale lakay ou, tanpri kontake founisè w la</p> <p><b>*Anplwaye Mass General Brigham yo gade nan paj 3</b></p>	<p>Se yon doktè ki pou evalye w pou l detèmine si w ka pran yon lòt dòz nan moman ki apwopriye a. Ou ka petèt bezwen fè tès sou po.</p>

**Si m te gen yon reyaksyon lokal oswa sentòm (lafyèv, fatig, frison, doulè nan misk) apre yon dòz vaksen, èske m ta dwe pran medikaman avan m pran yon lòt dòz? Non, sof si doktè w la rekòmande sa. Yo pa rekòmande pou pran medikaman sa yo avan w pran dòz adisyonèl yo mande w la pou anpeche sentòm sa yo parèt ankò. Ou ka pran medikaman pou lafyèv oswa pou soulaje doulè pou sentòm sa yo, si sa nesesè. Nou pa konnen sa k ap rive reyaksyon iminitè w fas ak vaksen kont COVID-19 la si w pran medikaman sa yo apre w fin pran l.**

**Pou vaksen ki mande dòz adisyonèl yo, tanpri fè tout efò pou resevwa dòz adisyonèl vaksen yo rekòmande a nan jou ak nan lè nou pwograme pou ou a. Si w bezwen chanje dat randevou w la, ou ka chanje dat la sou Patient Gateway (pòtay anliy pou pasyan nou yo).**

## Pou anplwaye Mass General Brigham yo sèlman

<b>Konsèy sou reyakson/sentòm apre vaksinasyon pou anplwaye yo</b>		
Pou tout enkyetid sou alèji apre vaksinasyon, Anplwaye MGB yo dwe rele Sèvis Santral pou Sante nan Travay (Occupational Health Central Services) nan 617 724-8100		
<b>Sou 3 jou apre vaksinasyon an, pandan w konte jou vaksinasyon an kòm 1ye jou a</b>		
Reyakson	Sa pou w fè	Restriksyon sou travay
<p>Sentòm ki lejè jiska modere, ki enkli nenpòt nan sentòm swivan yo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1.sansasyon lafyèv men tanperati a pi ba pase 101F (38.3C)</li> <li>2.maltèt lejè jiska modere</li> <li>3.nouvo fatig ki lejè jiska modere (sansasyon fatig)</li> <li>4.myalji ki lejè jiska modere (doulè nan misk)</li> <li>5.atralji ki lejè jiska modere (doulè nan jwenti)</li> </ul>	<p>Ou dwe fè tès pou COVID-19 si sentòm sa yo dire plis pase 24 èdtan an total. Opsyon pou fè tès yo gen ladan yo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pwograme yon tès atravè COVID PASS nan yon sant pou Tès Endividylel pou Anplwaye MGB si sit ou a ofri l oswa nan sit MGB pou Fè Tès (tanpri chwazi tès ochwa kòm rezon pou fè tès la).</li> <li>• Si w pa rive pwograme tès la atravè COVID Pass, tanpri rele Liy Asistans Telefonik pou Sante nan Travay la nan 617-724-8100 pou pwograme tès la</li> <li>• Osinon, ou ka fè tès la (PCR/NAAT yo se sèl tès ki akseptab) nan nenpòt sit pou fè tès ki pa fè pati MGB ki nan lis sou mass.gov, ki aksesib la a, epi soumèt rezulta w yo bay PHSOHCovid19@partners.org</li> </ul>	<p>Pa gen restriksyon Ou ka kontinye travay sou plas oswa adistans pandan w ap ret tann rezulta tès COVID-19 ou yo.</p>
<p>Sa yo komen anpil</p> <p>Sentòm ki grav, ki enkli nenpòt nan sentòm swivan yo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. lafyèv 101F (38.3C) oswa ki pi wo</li> <li>2. maltèt ki grav</li> <li>3. fatig ki grav (sansasyon fatig)</li> <li>4. myalji ki grav (doulè nan misk)</li> <li>5. atralji ki grav (doulè nan jwenti)</li> </ul> <p>Nenpòt lòt sentòm novo oswa pwogresif ki konsistan avèk COVID-19: malgòj, novo tous, novo konjesyon nazal oswa nen k ap koule pou premye fwa, novo sansasyon kote ou pèdi kapasite pou pran odè oswa pou pran gou, souf kout</p>	<p>W ap bezwen yo evalye w pou yon reyakson posib ak vaksen an oswa yon enfeksyon COVID-19. Ou dwe fè tès pou COVID</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tanpri rele Mass General Brigham sou liy asistans telefonik pou Sante nan Travay la nan 617-724-8100 pou pran randevou pou tès ak swivi.</li> <li>• Osinon, ou ka fè tès la (PCR/NAAT yo se sèl tès ki akseptab) nan nenpòt sit pou fè tès ki pa fè pati MGB ki nan lis sou mass.gov, ki aksesib la a, epi soumèt rezulta w yo bay PHSOHCovid19@partners.org</li> </ul>	<p>Ou paka travay sou plas pandan evalyasyon sa a ap fèt.</p>
Sa yo pa komen	<b>Plis pase 3 jou apre vaksinasyon an, pandan w konte jou vaksinasyon an kòm 1ye jou a</b>	
Nenpòt sentòm ki konsistan avèk COVID-19: lafyèv oswa sansasyon lafyèv, malgòj, novo tous, novo konjesyon nazal oswa nen k ap koule pou premye fwa, novo sansasyon kote ou pèdi kapasite pou pran odè oswa pou pran gou, souf kout	Itilize COVID PASS jan w itilize l nòmalman.	Ou paka travay sou plas pandan evalyasyon sa a ap fèt.