Вакцина от COVID-19

Узнайте, где можно сделать прививку от COVID-19 в Mass General Brigham и по месту жительства.

Обновленное руководство по вакцине от COVID-19

Вакцинация – это наилучший способ предотвратить заболевание и снизить риск развития тяжелого течения болезни и госпитализации. Когда вы получаете вакцинацию, вы также защищаете окружающих вас людей, в том числе тех, кто подвержен высокому риску развития осложнений при респираторных заболеваниях.

- CDC рекомендует, чтобы ВСЕ в возрасте от 6 месяцев и старше получили одну дозу обновленной (2024-2025) вакцины от COVID-19.
- Детям в возрасте от 6 месяцев до 4 лет может потребоваться больше чем одна доза вакцины от COVID-19, чтобы соответствовать своевременным обновлениям. Смотрите специфические рекомендации на веб-сайте CDC.
- Людям старше 65 лет или с ослабленным иммунитетом умеренной или тяжелой степенисследует получить дополнительную дозу обновленной вакцины против COVID-19 через 6 месяцев после получения первой дозы.

Мы призываем пациентов обращаться в ваши местные аптеки для прохождения вакцинации. Там применяют те же самые вакцины, что и в наших клиниках. Местные аптеки не могут проводить вакцинацию младенцев и детей младшего возраста. Пожалуйста, свяжитесь с офисом педиатра вашего ребенка, если вы испытываете трудности. Чтобы найти местную аптеку для получения вакцин от COVID-19, вы можете зайти на веб-сайт vaccines.gov или позвонить по телефону 1-800-232-0233. Многие офисы первичной и специализированной медицинской помощи по всему Mass General Brigham будут предлагать вакцины от COVID-19 во время регулярных визитов в эти офисы. Большинство наших клиник не предлагают приемы только для получения вакцины.

Должна ли моя обновленная вакцина быть такой же, как и первоначально полученная, или я могу их "смешивать и сочетать"?

Рекомендации CDC позволяют взрослым в возрасте 18 лет и старше получать обновленную вакцину, отличную от их первоначальной вакцины.

У меня уже был COVID-19. Следует ли мне делать прививку?

Да, вам все равно следует сделать вакцину, если вы перенесли COVID-19 и выздоровели. Если вы недавно болели COVID-19, вы можете отложить введение следующей дозы вакцины на 3 месяца с того момента:

- Когда начались ваши симптомы.
- Если у вас не было симптомов, когда вы впервые получили положительный тест на COVID.

Если у вас есть вопросы, подумайте о том, чтобы задать их вашему врачу. Для дополнительной информации посетите веб-сайт CDC.

О текущих вакцинах от COVID-19, разрешенных FDA для экстренного применения

Являются ли вакцины безопасными и эффективными?

Мы не будем рекомендовать вакцины, которые не продемонстрировали свою безопасность и эффективность. Все вакцины от COVID-19 доказали свою эффективность в предотвращении тяжелого заболевания, госпитализации и смерти от COVID-19. Эти результаты совпадали по полу, возрасту, расе и этнической принадлежности.
Каждая вакцина проходит строгий контроль со стороны регулирующих органов. Мы постоянно отслеживаем любые потенциальные проблемы всех вакцин – как клинические, так и в области безопасности. Для дополнительной информации, пожалуйста, посетите веб-сайт CDC.

Вакцины от COVID-19 компаний Pfizer и Moderna являются mRNA вакцинами. Что это означает?

Хотя мРНК-вакцины (mRNA – на англ.) – это новый вид вакцин, исследователи изучают и работают над ними уже много лет. Они не содержат живого вируса и не могут вызывать COVID-19. Вместо этого они дают нашим клеткам указания, как производить COVID-19 белки, находящиеся на внешнем слое коронавируса. Наша иммунная система сможет тогда вырабатывать антитела к этим белкам и защитить нас от заражения COVID-19. Сам мРНК из вакцин никогда не попадает в ядро наших клеток и не проникает в нашу ДНК. CDC располагает более подробной информацией о мРНК-вакцинах.

Как действует вакцина Novavax?

Вакцина Novavax – это белковая субъединичная вакцина. Эти вакцины содержат белки (называемые шиповидный белок) вируса, вызывающего COVID-19. Вакцина содержит еще один компонент, который помогает иммунной системе реагировать на шиповидный белок в будущем. Когда иммунная система знает, как реагировать на шиповидный белок, она может быстро отреагировать на настоящий шиповидный белок вируса и защитить людей от COVID-19. Этот тип вакцины был создан 30 лет назад и использовался для лечения гепатита-В и коклюша.

У CDC есть дополнительная информация о вакцинах на основе белковых субъединиц >

Аллергии

Вызывают ли вакцины от COVID-19 аллергические реакции?

Есть сообщения о людях, у которых после вакцинации возникали аллергические реакции. У небольшого числа людей наблюдалась тяжелая аллергическая реакция, называемая анафилаксией. Исходя из этого, Американское Управление по контролю за продуктами питания и лекарственными средствами (FDA – на англ.) и Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC – на англ.) рекомендуют людям, у которых в анамнезе есть анафилаксия на любой из компонентов вакцины от COVID-19, не получать эту вакцину. Люди с другими пищевыми или лекарственными аллергиями могут быть безопасно вакцинированы.
Как правило, большинство пациентов с аллергией на одну вакцину могут безопасно получать другие вакцины. Если у вас в анамнезе есть тяжелые аллергические реакции на вакцины, инъекционные препараты или любой компонент вакцины от COVID-19, вам следует поговорить с вашим провайдером (медработником) первичной помощи или аллергологом (если он у вас есть). Ваш провайдер поможет вам решить, безопасно ли быть вакцинированным.

Узнайте больше о возможных побочных эффектах >

Могу ли я получить вакцину от COVID-19, если у меня есть пищевая или лекарственная аллергия?

Вы можете получить вакцину от COVID-19, если у вас есть пищевая или лекарственная аллергия. Вакцины Pfizer, Moderna и Novavax COVID-19 не содержат желатин, яйца или латекс.

Кому следует проконсультироваться с врачом перед получением вакцины?

Консультация у аллерголога/иммунолога может быть вам полезна, если у вас есть следующие проблемы:

- Аллергия на вакцину в анамнезе с такими реакциями, как зуд, сыпь, аллергическая сыпь (hives – на англ.), отечность/ангионевротический отек, хриплое дыхание, одышка, стеснение в груди или анафилаксия

- История аллергии на полиэтиленгликоль (PEG – на англ.) или полисорбат с такими реакциями, как зуд, сыпь, hives, отечность/ангионевротический отек, хриплое дыхание, одышка, стеснение в груди или анафилаксия
- Реакция на дозу вакцины от COVID-19

Беременность, грудное вскармливание и фертильность

CDC, наши педиатры и акушеры-гинекологи рекомендуют беременным, планирующим забеременеть или кормящим грудью женщинам сделать вакцину от COVID-19. Пожалуйста, ознакомьтесь с полным текстом рекомендаций здесь.

Дети

CDC рекомендует детям в возрасте от 6 месяцев и старше получить обновленную вакцину от COVID-19. Вакцины компаний Pfizer и Moderna одобрены и рекомендованы для пациентов этой возрастной группы.

Пожалуйста, ознакомьтесь с детальной информацией на веб-сайте CDC. Если у вас есть вопросы о вакцине для вашего ребенка, пожалуйста, обратитесь в офис вашего педиатра.

Где я могу получить дополнительную информацию?

- Бенефиты получения вакцины от COVID-19
- Вакцина от COVID-19 в штате Massachusetts
- Вакцина от COVID-19 в штате New Hampshire
- Управление по контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA - на англ.): Вакцина Pfizer-BioNTech от COVID-19
- Управление по контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов: Вакцина Moderna против COVID-19
- Вакцинация против COVID-19 вакциной компании Novavax
- Понимание мРНК вакцин от COVID-19
- Тестирование на COVID-19 | Mass General Brigham

Обновлено 20 декабря 2024 г.