關於新冠病毒病 (英語簡稱 COVID-19) 檢測

如果您出現症狀或曾與 COVID-19 感染者有密切接觸，檢測是保護您的家人、朋友和社區的重要方法。家居式抗原測試劑是檢測 COVID-19 最簡便的方法。

從 2024 年 9 月底開始，美國居民住戶可以免費訂購四個快速抗原 COVID-19 測試劑。每個地址限一份訂單。您可以在 COVIDTests.gov 網站上訂購這些測試劑。

常見問題解答

何時以及為何

誰應該接受 COVID-19 檢測？

如果您有呼吸道症狀 或曾與 COVID-19 患者有密切接觸，我們建議您接受 COVID-19 檢測。家居式抗原測試劑日漸成為檢測 COVID-19 最簡便的方法。

在家中做檢測

如何取得家居式抗原測試劑？

從 2024 年 9 月底開始，美國居民住戶可以免費訂購四個家居式快速抗原 COVID-19 測試劑。每個地址限一份訂單。您可以在 COVIDTests.gov 網站上訂購這些測試劑。

您可以到零售藥店或在網上選購家居式 COVID-19 測試劑。以下是獲取或訂購 COVID-19 測試劑的一些選項：

- COVID-19 檢測資源 – 按州搜索|疾病控制和預防中心 (CDC-英語簡稱)
- 家居式 COVID 測試劑 – CVS 藥房
- COVID-19 檢測和地點 |Walgreens Find Care
- COVID-19 測試劑– 亞馬遜網站|Amazon.com
- 我們還有社區護理專車，在特定日期和時間提供限量的 COVID-19 檢測，毋須預約。我們何時到訪您住的社區，請查看時間表 。

我在家做檢測，結果呈陽性。我是否要接受「聚合酶鏈式反應」(英語簡稱-PCR) 檢測嗎？

如果您使用家居式測試劑，結果呈陽性，則您感染了 COVID-19。 **您不需要進行 PCR 檢測來確認。** 請留在家裡並遠離他人，直到：

- 您的症狀在 24 小時內有所改善 **並且**
- 您在**未**使用對乙醯氨基酚（泰諾/Tylenol）或布洛芬(Motrin、Advil）等退燒藥物的情況下連續 24 小時沒有發燒。

我的檢測結果呈陰性，但我仍然有呼吸道症狀。我該怎麼辦？

如果您有呼吸道症狀，您應該留在家中並遠離他人，直到：

- 您的症狀在 24 小時內有所改善 **並且**
- 您在**未**使用對乙醯氨基酚（泰諾/Tylenol）或布洛芬(Motrin、Advil）等退燒藥物的情況下連續 24 小時沒有發燒。

如果您沒有症狀，則毋須留在家中和遠離他人。

檢測結果呈陽性

我是否有高風險患 COVID-19 重症？

有高風險得 COVID-19 重症的因素包括正在接受癌症治療、目前正在服用與移植有關的藥物或針對其他疾病的免疫抑制藥物。其他高風險因素，包括患有慢性肺病、腎病或肝病；糖尿病;艾滋病(HIV);肥胖症;以及 65 **歲**或以上，可能會使您因 COVID-19 或流感而出現更嚴重的症狀。 疾病預防控制中心(英語簡稱- CDC)有更多資訊。

如果您有一種或多種因素使您有高風險得 COVID-19 重症，那麼您可能符合條件在感染 COVID 後接受 門診 COVID-19 治療 。

我的檢測結果呈陽性。我沒有高風險得重症，但我擔心自己的症狀。我該怎麼辦？

- 如果您的檢測結果呈陽性、症狀輕微且沒有高風險得 重症，請留在家裡直到：
  - 您的症狀在 24 小時內有所改善 **並且**
  - 您在**未**使用對乙醯氨基酚（泰諾/Tylenol）或布洛芬(Motrin、Advil）等退燒藥物的情況下連續 24 小時沒有發燒。
- 如果您有中度症狀，請致電您的醫生。
- 如果您有嚴重症狀，請前往急診室。

閱讀更多有關陽性檢測結果後應該做什麼的資訊>

我的檢測結果呈陽性，且我有高風險得重症。我擔心我的症狀。我該怎麼辦？

- 如果您有高風險得 重症，那麼您應該聯繫您的醫生辦公室，詢問有關 COVID-19 治療，或者利用馬薩諸塞州公共衛生部 (Massachusetts Department of Public Health)提供的 免費遠程就診 。開診時間從上午 8 時至晚上 10 時。
- 如果您居住在其他州（包括新罕布夏州|New Hampshire），您可以 使用國家治療定位器來尋找治療地點。

2024 年 12 月 20 日更新