

علاجات كوفيد-19 للمرضى في العيادات الخارجية

يمكن للأجسام المضادة وحيدة المنشأ (التي تُعطى عن طريق الوريد) والعلاجات المضادة للفيروسات أن تقلل من خطر الإصابة بفيروس كوفيد-19 الشديد لدى الأشخاص المعرضين لخطر كبير.

تتوفر هذه العلاجات في Mass General Brigham وفي [مواقع العلاج التابعة لإدارة الصحة العامة في ولاية ماساتشوستس](#).

يرجى عدم الذهاب إلى الرعاية العاجلة أو غرفة الطوارئ لأي من هذه العلاجات؛ هذه ليست متوفرة في تلك المواقع. هناك عيادات محددة مصممة لتقديم هذا العلاج. يرجى الاتصال بمقدم الرعاية الأولية الخاص بك أو الأخصائي الخاص بك (على سبيل المثال، طبيب الأورام وأخصائي الروماتيزم) لإحالتك للحصول على الأجسام المضادة وحيدة المنشأ إذا كنت مؤهلاً.

الأجسام المضادة وحيدة المنشأ (mAb) - سوتروفيماب

أصدرت إدارة الأدوية الفيدرالية (FDA) ترخيصاً للاستخدام في حالات الطوارئ (EUA) للعديد من الأجسام المضادة وحيدة المنشأ. يمكن أن تساعد هذه الأجسام المضادة جهاز المناعة على الاستجابة لمحاربة الفيروس. توفر [إرشادات علاج كوفيد-19 من المعاهد الوطنية للصحة معلومات](#) حول هذه الأدوية.

ما هو سوتروفيماب؟

Sotrovimab هو الجسم المضاد الوحيد المنشأ الفعال ضد متغير أوميكرون كوفيد-19. يتم استخدامه للمرضى الذين يعانون من [أعراض كوفيد-19](#). لا يتوفر Sotrovimab للمرضى الذين تعرضوا لـ كوفيد-19، لكنهم لم يصابوا بالفيروس.

كيف يتم إعطاء سوتروفيماب؟

يُعطى سوتروفيماب بالتسريب الوريدي (وليس حبة).

متى يجب إعطاء سوتروفيماب؟

يعمل العلاج بالأجسام المضادة وحيدة المنشأ بشكل أفضل عند إعطائه خلال الأيام القليلة الأولى من [الأعراض](#). إذا كانت الأعراض تتحسن بالفعل، فمن المحتمل ألا يكون العلاج ضرورياً.

هل يمكنني الحصول على علاج بالأجسام المضادة أحادية المنشأ إذا تلقيت التطعيم ثم حصلت على كوفيد-19؟
قد تكون قادراً على الحصول على العلاج بالأجسام المضادة وحيدة المنشأ إذا تم تطعيمك ضد كوفيد-19. يجب أن تفي بمعايير الأهلية.

إذا لم يتم تطعيمي، فهل يمكنني الحصول على العلاج بالأجسام المضادة وحيدة المنشأ؟

قد تحصل على هذا العلاج إذا لم يتم تطعيمك. يجب أن تفي بمعايير الأهلية. يرجى ملاحظة أنه بعد التعافي من كوفيد-19، إذا تلقيت علاجاً بالأجسام المضادة أحادية المنشأ، فيجب عليك تأخير تلقي التطعيم لمدة 90 يوماً بعد تلقي العلاج.

ما مدى فعالية العلاج بالأجسام المضادة وحيدة المنشأ؟

أظهر العلاج بالأجسام المضادة وحيدة المنشأ أنه يقلل من خطر الاستشفاء لدى المرضى المعرضين لخطر كبير للإصابة بـ كوفيد-19 الوخيم عند إعطائهم مبكراً في عدوى كوفيد-19 المصحوبة بأعراض. وجدت التجارب انخفاضاً في خطر الاستشفاء بنسبة تصل إلى 70% إلى 90% مع هذا العلاج مقارنةً بعدم العلاج.

من هو المؤهل للحصول على هذا العلاج؟

- يتوفر علاج سوتروفيماب للمرضى الذين تبلغ أعمارهم 12 عامًا فما فوق والذين:
- تأكد من وجود كوفيد-19 عن طريق فحص المستضد أو فحص PCR، و
 - لديك أعراض كوفيد-19، و
 - تكون في غضون 10 أيام من بدء الأعراض، و
 - لديك **حالة** صحية تجعلهم أكثر عرضة للإصابة بعدوى كوفيد-19.

كيف أحصل على هذا العلاج إذا كنت مصابًا بـ كوفيد-19؟

تتوفر هذه العلاجات في Mass General Brigham وفي مواقع العلاج التابعة لإدارة الصحة العامة في ولاية ماساتشوستس. كلا الموقعين خيارات ممتازة للعلاج. إذا كنت تعتقد أنك قد تكون مؤهلاً للعلاج، فيرجى الاتصال بمقدم الرعاية الأولية أو الاختصاصي للإحالة.

لا تذهب إلى قسم الرعاية العاجلة أو غرفة الطوارئ لأي من هذه العلاجات. لم تكن متوفرة في تلك المواقع. هناك عيادات محددة مصممة لتقديم هذا العلاج.

لقد تم تحويلي لهذا العلاج، ماذا سيحدث بعد ذلك؟

إذا كنت قادرًا على الحصول على العلاج، فسنصل بك لإبلاغك بالمعلومات والتعليمات. بالنسبة للمرضى المسجلين في بوابة المريض، سوف نرسل رسالة بوابة المريض إذا قررنا أنه لا يمكننا تقديم العلاج. إذا لم تكن مسجلًا في بوابة المريض فيمكنك التسجيل [هنا](#). إذا أحال مقدم الخدمة الخاص بك إلى مواقع العلاج التابعة لإدارة الصحة العامة، فسنلقى مكالمة إذا كان من الممكن استيعابك. إنهم لا يتصلون حاليًا بالمرضى أو بـ Mass General Brigham إذا لم تتمكن من العلاج.

العلاجات الفموية المضادة للفيروسات لـ كوفيد-19 - باكسلوفيد ومولنوبيرافير

تؤخذ العلاجات المضادة للفيروسات عن طريق الفم لعلاج الأعراض الخفيفة إلى المتوسطة لـ كوفيد-19. أصدرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) تراخيص الاستخدام الطارئ (EUAs) لـ [Paxlovid](#) من شركة فايزر (أقراص nirmatrelvir وأقراص ritonavir) و [molnupiravir](#) من Merck. يبطئ هذان الدواءان من قدرة كوفيد-19 على التكاثر.

متى يتم استخدام باكسلوفيد ومولنوبيرافير؟

يتم استخدامها للمرضى الذين تظهر عليهم أعراض كوفيد-19. إنه غير متوفر للمرضى الذين تعرضوا لـ كوفيد-19، لكن لم يصابوا بالفيروس.

كيف يتم إعطاؤهم؟

كل من باكسلوفيد ومولنوبيرافير حبوب تؤخذ عن طريق الفم. وهي متوفرة بوصفة طبية فقط.

متى يجب إعطاؤهم؟

يجب إعطاء باكسلوفيد ومولنوبيرافير خلال 5 أيام من بداية الأعراض.

هل يمكنني الحصول على Paxlovid أو molnupiravir إذا تلقيت التطعيم ثم حصلت على كوفيد-19؟

نعم. تتوفر العلاجات المضادة للفيروسات عن طريق الفم للمرضى الذين تم تطعيمهم والذين لم يتم تطعيمهم بعد.

إذا لم ألتق التطعيم، فهل يمكنني الحصول على هذه العلاجات؟

نعم. يمكن أن تساعدك العلاجات المضادة للفيروسات أيضًا.

ما مدى فعالية هذه العلاجات المضادة للفيروسات عن طريق الفم؟
في التجارب السريرية ، قلل Paxlovid من فرص الحاجة إلى دخول المستشفى بحوالي 90٪. كان لدى Molnupiravir تأثير أقل
ولكنه لا يزال يقلل المخاطر بنحو 30 ٪. يبدو أن كلا الدواءين ينفذ الأرواح.

من هو مؤهل للحصول على Paxlovid؟

يتوفر علاج Paxlovid للمرضى الذين تبلغ أعمارهم 12 عامًا فما فوق والذين:

- تزن 40 كجم على الأقل (ما يزيد قليلاً عن 88 رطلاً)، و
- تأكد من وجود كوفيد-19 عن طريق فحص المستضد أو فحص PCR، و
- لديك أعراض كوفيد-19، و
- خلال 5 أيام من بدء الأعراض، و
- لديك حالة صحية تجعلهم أكثر عرضة للإصابة بعدوى كوفيد-19 الشديدة.

من هو المؤهل للحصول على مولنوبيرافير؟

يتوفر علاج Molnupiravir للمرضى الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا فما فوق والذين:

- تأكد من وجود كوفيد-19 عن طريق فحص المستضد أو فحص PCR، و
- لديك أعراض كوفيد-19، و
- خلال 5 أيام من بدء الأعراض، و
- لديك حالة صحية تجعلهم أكثر عرضة للإصابة بعدوى كوفيد-19 الشديدة.
- يرجى ملاحظة أننا سوف نقدم عقار Molnupiravir فقط للمرضى الذين تبلغ أعمارهم 55 عامًا أو أكبر.

كيف أحصل على هذه العلاجات إذا كنت مصابًا بـ كوفيد-19؟

إذا كنت تعتقد أنك قد تكون مؤهلاً للعلاج، فيرجى الاتصال بمقدم الرعاية الأولية أو الأخصائي. يمكنهم إحالتك للعلاج.

ريمديسيفير Remdesivir :

ما هو Remdesivir ؟

Remdesivir هو دواء معتمد من إدارة الأغذية والدواء (FDA) يتدخل في كيفية تكاثر فيروس كوفيد-19 (COVID-19). يمكن أن يساعد الأشخاص المصابين بكوفيد-19 (COVID-19) على التعافي بشكل أسرع ويقلل من فرص الإصابة بفيروس كوفيد-19 (COVID-19) الحاد. يمكن استخدامه أيضًا لعلاج المرضى في المستشفى ، لكننا هنا نركز استخدامه لمنع دخول المستشفى. توفر [إرشادات علاج كوفيد-19 \(COVID-19\) من المعاهد الوطنية للصحة \(NIH\)](#) معلومات حول هذا الدواء.

كيف يتم إعطاء Remdesivir؟

يتم إعطاء Remdesivir عن طريق 3 دفعات وريدية (IV) يوميًا. إنها ليست حبة دواء.

متى يجب إعطاء Remdesivir؟

يعمل Remdesivir بشكل أفضل عند إعطائه مبكرًا على الأقل خلال الأيام السبعة الأولى من الأعراض. إذا كنت تتحسن بالفعل ، فربما لا يكون العلاج ضروريًا.

هل يمكنني الحصول على علاج Remdesivir إذا تلقيت اللقاح ثم أصبت بكوفيد-19 (COVID-19)؟
يمكنك الحصول على Remdesivir إذا تم تلقيحك ضد كوفيد-19 (COVID-19). يجب أن تفي بمعايير الأهلية.

إذا لم يتم تطعيمي ، فهل يمكنني الحصول على علاج Remdesivir؟
يمكنك الحصول على Remdesivir إذا لم يتم تطعيمك. يجب أن تفي بمعايير الأهلية.

ما مدى جودة علاج Remdesivir؟

لقد ثبت أن Remdesivir يقلل من فرصة دخول المستشفى بنسبة 82٪ ويساعد الناس على التحسن بشكل أسرع.

من هو المؤهل للحصول على هذا العلاج؟

يتوفر Remdesivir للمرضى الذين تبلغ أعمارهم 12 عامًا فما فوق على ان يكون:

- الوزن 40 كجم على الأقل و
- تم التأكد من الإصابة بكوفيد-19 (COVID-19) عن طريق اختبار المستضد أو اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل و
- هناك اعراض لكوفيد-19 (COVID-19)
- خلال 7 أيام من بدء الأعراض و
- هناك حالة صحية تجعلهم أكثر عرضة للإصابة بعدوى بكوفيد-19 (COVID-19) الشديدة.

كيف أحصل على هذا العلاج إذا كنت مصابًا بكوفيد-19 (COVID-19) ؟

إذا كنت تعتقد أنك قد تكون مؤهلاً ، فيرجى الاتصال بمقدم الرعاية الأولية أو المتخصص. يمكنهم إحالتك للعلاج. يرجى ملاحظة أنه بسبب العرض المحدود ، لن يتمكن جميع المرضى المحالين من تلقي العلاج.

لا تذهب إلى الرعاية العاجلة أو غرفة الطوارئ أو لأي من هذه العلاجات. لن تكون متوفرة في تلك الاماكن. هناك عيادات محددة مصممة لتقديم هذا العلاج.

لقد تم تحويلي لهذا العلاج ، ماذا سيحدث بعد ذلك؟

لدينا كميات محدودة من Remdesivir متاحة. إذا كنت قادرًا على الحصول على العلاج ، فستصل بك لإبلاغك بالمعلومات والتعليمات. بالنسبة للمرضى الموجودين على بوابة المريض Patient Gateway ، سنرسل رسالة على بوابة المريض Patient Gateway إذا قررنا أنه لا يمكننا تقديم العلاج.

Evusheld:

ما هو Evusheld ؟

(Evusheld) Cilgavimab /Tixagevimab هو مزيج من الأجسام المضادة يستخدم للوقاية من كوفيد-19 (COVID-19) في الأشخاص الذين لا يمكن أن يتمتعوا بالحماية الكافية عن طريق اللقاح. أصدرت إدارة الدواء و الغذاء الأمريكية (FDA) ترخيصًا لاستخدام Evusheld في حالات الطوارئ (EUA) . يحتوي هذا الدواء على أجسام مضادة وحيدة النسيلة يمكن أن تساعد جهاز المناعة على الاستجابة لمحاربة الفيروس. يتم استخدامه لتقليل خطر الإصابة بعدوى كوفيد-19 (COVID-19) في المرضى الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة. انها ليست بديلا عن اللقاح. كما أنه لا يستخدم لعلاج عدوى كوفيد-19 (COVID-19). توفر الإرشادات العلاجية لكوفيد-19 (COVID-19) من المعاهد الوطنية للصحة معلومات حول هذا الدواء

كيف يتم إعطاء Evusheld؟

يتم إعطاء Evusheld عن طريق الحقن. انها ليست حبة.

من هو المؤهل للحصول على هذا العلاج؟ يتوفر Evusheld للمرضى الذين تبلغ أعمارهم 12 عامًا فما فوق والذين:

- يزنون 40 كجم على الأقل (ما يزيد قليلاً عن 88 رطلاً) و
- لا يعانون من إصابة حالية أو لم يتعرضوا مؤخراً لفيروس كوفيد-19 (COVID-19) و
- حاصلين على اللقاحات لكوفيد-19 (COVID-19) (ما لم يكن هناك سبب طبي يمنع التطعيم ، مثل الحساسية الشديدة) و
- لديهم جهاز مناعي ضعيف ، وبالتالي ، قد يكون لديهم استجابة مناعية غير كافية للقاح ضد كوفيد-19 (COVID-19)

هل يمكنني الحصول على Evusheld إذا حصلت على اللقاح؟

نعم. يجب أن يتم اعطائك اللقاح بالكامل قبل تلقي Evusheld. من الجدير بالذكر أنه يجب إعطاء Evusheld بعد أسبوعين على الأقل من تلقي اللقاح.

هل يمكنني الحصول على Evusheld إذا لم احصل على اللقاح؟

لا ، Evusheld ليس بديلاً عن لقاح كوفيد-19 (COVID-19). لن يتم استخدامه للأشخاص الذين لم يتلقوا اللقاح الذين يتوقع أن يكون لديهم استجابة مناعية كافية للقاح. الاستثناء الوحيد هو وجود سبب طبي ضد الحصول على اللقاح (على سبيل المثال: تاريخ من رد فعل تحسسي شديد للقاح كوفيد-19 (COVID-19)).

ما مدى جودة عمل Evusheld؟

ليس معروفًا حقًا إذا كان يعمل Evusheld جيدًا في الأشخاص الذين يعانون من **ضعف في جهاز المناعة**. ثبت أن Evusheld يقلل من فرصة الإصابة بنسبة 77 ٪ في دراسة واحدة لدى الأشخاص الذين لديهم جهاز مناعة طبيعي. ومع ذلك ، من المرجح أن تكون الحماية لدى الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة أقل.

كيف أحصل على علاج Evusheld؟

إذا كنت تعتقد أنك قد تكون مؤهلاً ، فيرجى الاتصال بمقدم الرعاية الأولية أو المتخصص. يمكنهم إحالتك لتلقي Evusheld.

يرجى ملاحظة أن Evusheld لا يستخدم لعلاج كوفيد-19 (COVID-19). يتم استخدامه لتقليل خطر الإصابة بعدوى كوفيد-19 (COVID-19) في المرضى الذين يعانون من **ضعف في جهاز المناعة**.

لا تذهب إلى الرعاية العاجلة أو غرفة الطوارئ أو الرعاية العاجلة لعلاج Evusheld ؛ إنه غير متوفر في تلك المواقع. هناك عيادات محددة مصممة لتقديم هذا العلاج.

لقد تم تحويلي لهذا العلاج ، ماذا سيحدث بعد ذلك؟

لدينا كميات محدودة من Evusheld متاحة. إذا يمكنك الحصول على العلاج ، فسنصل بك لإبلاغك بالمعلومات والتعليمات. بالنسبة للمرضى الموجودين على بوابة المريض Patient Gateway ، سنرسل رسالة على بوابة المريض Patient Gateway إذا قررنا أنه لا يمكننا تقديم العلاج.

من هو المؤهل لهذه العلاجات؟

لتلقي العلاج في العيادة الخارجية لـ كوفيد-19، يجب أن يكون لديك كوفيد-19 مؤكدًا إما عن طريق اختبار المستضد أو PCR. يجب أيضًا أن تكون مصابًا بحالة صحية تجعلك أكثر عرضة للإصابة بعدوى كوفيد-19 الشديدة.

تشمل الحالات عالية الخطورة للإصابة بفيروس كوفيد-19 الشديد ما يلي: الخضوع لعلاج السرطان ، أو تناول الأدوية حاليًا للزراعة، أو الأدوية المثبطة للمناعة لحالات أخرى. الحالات الأخرى عالية الخطورة، بما في ذلك الإصابة بأمراض الرئة أو الكلى أو الكبد المزمنة ؛ داء السكري؛ فيروس نقص المناعة البشرية؛ بدانة؛ وعمر 65 عامًا أو أكثر ، قد يعرضك مسبقًا لأعراض أسوأ من كوفيد-19 أو الأنفلونزا. [تعرف على المزيد حول الظروف الصحية المهنية من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها \(CDC\).](#)

تم التحديث في 10 آذار / مارس، 2022